

Mějte tuto kartu stále u sebe.

Informační karta pacienta Polapix (apixabanum)

Ukažte tuto kartu svému lékárníkovi,
zubnímu lékaři a každému
zdravotnickému pracovníkovi, který
Vás má v péči.

Podstupuji antikoagulační léčbu
přípravkem Polapix (apixabanum)
k zabránění tvorby krevních sraženin.

Vyplňte prosím tuto část,
nebo o to požádejte svého lékaře.

Jméno: _____

Indikace: _____

Datum narození: _____

Dávka: _____ mg dvakrát denně

Jméno lékaře: _____

Telefon lékaře: _____

[_____item-place_____]

Miejsce naniesienia kodu QR
zawierające adres
[https://polpharma.pl/int/cz/minimalizace-rizika/
oraz numer wewnętrzny drukarni](https://polpharma.pl/int/cz/minimalizace-rizika/oraz-numer-wewnetrzny-drukarni)



Informace pro pacienty

Užívejte Polapix pravidelně podle pokynů. Jestliže vynecháte dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, a pokračujte podle svého rozpisu dávkování.

Nevysazujte Polapix, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem, protože riskujete cévní mozkovou příhodu nebo jiné komplikace.

- Polapix pomáhá ředit krev. Může ale zvýšit riziko krvácení.
- Příznaky a známky krvácení zahrnují modřiny nebo krvácení pod kůží, asfaltově zbarvenou stolicí, krev v moči, krvácení z nosu, závratě, únavu, bledost nebo slabost, náhlou silnou bolest hlavy, vykašlávání nebo zvracení krve.
- Jestliže krvácení samo nepřestane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Jestliže potřebujete chirurgický zákrok nebo jakoukoli invazivní proceduru, informujte lékaře, že užíváte přípravek Polapix.

Informace pro zdravotnické pracovníky

Polapix (apixabanum) je perorální antikoagulans působící přímou selektivní inhibicí faktoru Xa.

Polapix může zvýšit riziko krvácení. V případě závažných příhod krvácení musí být okamžitě vysazen.

Léčba přípravkem Polapix nevyžaduje rutinní monitorování expozice. Ve výjimečných situacích může být užitečný kalibrovaný kvantitativní anti-Faktor Xa test, např. při předávkování nebo naléhavé operaci (testy srážlivosti protrombinový čas (PT), mezinárodní normalizovaný poměr (INR) a aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) se nedoporučují) – viz SPC.

Je k dispozici látka ke zvrácení aktivity apixabanu proti faktoru Xa.