

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директору

Бекбоев К.Т.

« 6 » *ноябрь* 2024-ж.



Кошумча баракча – бейтап үчүн маалымат

Ибуфен Ультра, 200 мг, капсулалар

Таасир берүүчү зат: ибупрофен

Бул дары препаратын колдонуудан мурун кошумча баракчаны толугу менен окуп чыгыңыз, анткени анда сиз үчүн маанилүү маалымат бар.

Бул дары препаратын ар дайым кошумча баракчада көрсөтүлгөндөй же дарыгериңиз же дарыкана кызматкеринин көрсөтмөсүнө ылайык кабыл алыңыз.

- Кошумча баракчаны сактаңыз. Сиз аны кайра окушуңуз керек болушу мүмкүн.
- Эгер сизге көбүрөөк маалымат же кеңеш керек болсо, дарыкана кызматкеринен сураңыз.
- Эгерде сизде кандайдыр бир жагымсыз реакциялар байкалса, дарыгерге же дарыкана кызматкерине кайрылыңыз. Бул сунуш ар кандай мүмкүн болгон жагымсыз реакцияларга, анын ичинде кошумча баракчанын 4-бөлүмүндө көрсөтүлбөгөндөргө тиешелүү.
- Эгерде 3 күндөн кийин абалыңыз жакшырбаса же начарлап кетсе, дарыгерге кайрылуу керек.

Кошумча баракчанын камтылышы

1. Ибуфен Ультра деген эмне жана ал эмне үчүн колдонулат.
2. Ибуфен Ультра препаратын кабыл алуудан мурун эмнени билишиңиз керек.
3. Ибуфен Ультра препаратын кабыл алуу.
4. Мүмкүн болгон жагымсыз реакциялар.
5. Ибуфен Ультра препаратын сактоо.
6. Таңгакчанын камтылышы жана башка маалымат.

1. Ибуфен Ультра деген эмне жана ал эмне үчүн колдонулат

Ибуфен Ультра препараты таасир берүүчү зат ибупрофенди камтыйт, стероиддик эмес сезгенүүгө каршы препараттар (ССКП) тобуна кирет. Препарат калтыроо, оору жана шишимик сыяктуу симптомдорду жок кылат.

Ибуфен Ультра препараты 12 жаштан ашкан өспүрүмдөрдө жана чоңдордо колдонулат.

Ибупрофен суук тийүү жана сасык тумоо симптомдорун, жеңил жана орточо ооруну басаңдатуучу (ооруну басаңдатуучу) катары тамактын оорусу, тиштин оорушу, чыгып келе жаткан тиштин оорушу, кулактын оорушу, баш оорусу, шакый, перифериялык нервдердин бузулушу, көгөргөн жана чоюлган оору сыяктуу учурда колдонулат. Дары препарат ошондой эле иммунизациядан кийин пайда болгон, анын ичинде жогорку дене табын (калтыроо) азайтат.

2. Ибуфен Ультра препаратын кабыл алуудан мурун эмнени билишиңиз керек

Каршы көрсөтмөлөр

Ибуфен Ультра препаратын кабыл албаңыз:

- эгерде сизде ибупрофенге, башка стероиддик эмес сезгенүүгө каршы препараттарга (ССКП) же ушул дары препаратынын башка компоненттерине (кошумча баракчанын б-бөлүмүндө келтирилген) аллергиясы бар болсо
- эгерде сизде ацетилсалицил кислотасын (аспирин) же башка ССКП кабыл алуудан келип чыккан бронхиалдык астма, бөрү жатыш, ринит бар болсо
- эгерде сизде ашказан-ичеги жолунун жаралуу жарасы бар болсо (ашказан жана он эки эли ичегинин жарасы, жаралуу колит)
- ашказан-ичеги жолунан кан агуу болсо
- эгерде сизде ибупрофен же башка ССКПлерди кабыл алгандан кийин ашказаныңыздан кан агуу же тешилүү болгон болсо
- эгерде сизде оор бөйрөк же боордун алсыздыгы же оор жүрөк жетишсиздиги болсо
- эгерде сизде мээнин кан тамырларынан же курч кан агуунун башка түрлөрү болсо
- эгерде сизге кан агуунун бузулушу диагнозу коюлган болсо
- кош бойлуулуктун үчүнчү үч айлыгында.

Ибуфен Ультра дары препаратын **12 жашка чейинки балдарга же салмагы 40 кг дан ашпаган балдарга колдонбоңуз.**

Өзгөчө көрсөтмөлөр жана алдын алуу сактык чаралары

Ибуфен Ультра препаратын кабыл алганга чейин сизди дарылаган дарыгерге же дарыкана кызматкерине кеңеш алууга кайрылыгыла.

Симптомдорду жеңилдетүү үчүн зарыл болгон эң кыска мөөнөткө препаратты кабыл алуу жагымсыз реакциялардын пайда болуу коркунучун азайтат.

Ибуфен Ультра препаратын кабыл алуунун алдында, төмөнкү учурларда дарыгерге кайрылуу керек:

- сизде бөйрөктүн функциясы бузулган болсо
- сизде боордун функциясы бузулган болсо
- сизде артериялык кан басым жогору болсо
- сизге же сиздин үй-бүлөңүзгө жүрөк жетишсиздиги, стенокардия (көкүрөк оорусу) сыяктуу жүрөк оорулары диагнозу коюлган болсо, жүрөк пристубун, коронардык артерияны шунттоо операциясын баштан кечирген болсоңуз, перифериялык артерия

оорусу менен жабыркаган болсоңуз (артериялардын тыгыны же тарышы сыяктуу колу-буттардагы кан айлануунун начарлашы), же сиз кандайдыр бир инсультка кабыл болсоңуз (анын ичинде микроинсульт же транзитордук ишемиялык чабуул - ТИА)

- сизде системалуу кызыл канчоо же кандайдыр бир иммундук система оорусу бар болсо
- сизде кант диабети бар болсо
- сизде холестеролдун деңгээли жогору болсо
- сиз чылым чеккен болсоңуз
- сизде бронхиалдык астма же өпкөнүн башка аллергиялык оорусу бар болсо
- сизде ашказан-ичеги оорулары, ошондой эле ашказан-ичегинин өнөкөт сезгенүү оорулары (жаралуу колит же Крон оорусу)
- сиз улгайып калган болсоңуз
- сизде суу чечек бар болсо – «Инфекциялар» бөлүмүн караңыз
- сиз бала же өспүрүмсүз жана сиз суусузданган болсоңуз, анткени бул бөйрөктүн бузулуу коркунучун жогорулатат
- сиздин түздөн-түз хирургиялык операциядан кийинки абалыңыз.

Ашказан-ичеги жолуна тийгизген таасири

Эгерде сизде ашказан же ичеги жарасы, айрыкча тешик же кан агуу менен татаалдашкан болсо, анда сиз ашказан-ичеги ооруларынан кандайдыр бир симптомдор байкалса, өзгөчө дарылоонун башталышында дароо дарыгерге кабарлашыңыз керек. Бул Ибуфен Ультра дары препараттын колдонууда, айрыкча, улгайган бейтаптарда ашказан-ичеги жарасынын же кан кетүү коркунучунун жогорулашынан улам жасалышы керек. Дары препараты менен дарылоо ашказан-ичеги жарасы же ашказан-ичегиден кан кеткен учурда токтоосуз түрдө токтотулушу керек. Ашказан-ичеги жарасы же ашказан-ичеги жолунан кан агуулар мурунку симптомдору жок эле, ошондой эле мурда мындай диагноз коюлбаган бейтаптарда да болушу мүмкүн. Ашказан-ичегинин жарасы же кан кетүү коркунучу колдонулган препараттын дозасын көбөйтүүгө пропорционалдуу, ошондой эле Ибуфен Ультраны башка кээ бир дары препараттары менен айкалыштырууда жогорулайт. Жагымсыз реакциялардын коркунучун эң аз дозаны эң кыска убакытка колдонуу менен азайтууга болот.

Кан айлануу системасына тийгизген таасири

Ибуфен Ультра камтыган стероиддик эмес сезгенүүгө каршы дары препараттар курч жүрөк-кан тамыр ооруларынын, атап айтканда миокард инфаркты жана инсульт коркунучун бир аз жогорулатат, айрыкча жогорку дозада колдонулганда. Ошондуктан, Ибуфен Ультра менен дарылоонун сунушталган дозаларын жана узактыгынан ашпаңыз.

Тери реакциялары

Ибупрофенди колдонгондо олуттуу тери реакциялары билдирилген. Сиз дароо кабыл алууну токтотушуңуз керек, эгерде териде исиркектер, былжыр челдин жаралары, ыйлаакчалар же аллергиянын башка белгилери пайда болсо, Ибуфен Ультра препараттын кабыл алууну токтотушуңуз керек жана дарыгерге кайрылыңыз, анткени сүрөттөлгөн белгилер олуттуу тери реакциясынын алгачкы белгилери болушу мүмкүн (4-бөлүмдү

караныз).

Инфекциялар

Ибуфен Ультра препаратын колдонуу калтыроо жана оору сыяктуу инфекциянын белгилерин жана симптомдорун жашырышы мүмкүн. Натыйжада, инфекцияны адекваттуу дарылоодо кечигүү болушу мүмкүн, бул татаалдашуу коркунучун күчөтүшү мүмкүн. Бул бактериялык пневмонияда, ошондой эле суу чечек менен байланышкан бактериялык тери инфекциясында байкалат. Эгерде сиз Ибуфен Ультраны жугуштуу ооруга кабылсаңыз жана симптомдордун туруктуулугун же начарлашын байкасаңыз, дароо дарыгерге кайрылууңуз керек.

Ибуфен Ультра менен дарыланган бейтаптарда асептикалык менингиттин (бактериялык эмес мүнөздөгү мээ кабыкчасынын сезгениши) учурлары катталган. Жогорудагы жагымсыз реакциялар аутоиммундук оорулары бар бейтаптарда көбүрөөк кездешкенине карабастан, өнөкөт оорулары жок бейтаптарда мындай патологиянын пайда болуу коркунучу бар.

Ибуфена Ультра препаратын кабыл алуу кош бойлуу болуу мүмкүнчүлүгүн азайтышы мүмкүн. Эгер сиз кош бойлуу болууну пландап жатсаңыз же кош бойлуу болуу кыйынга турса, дарыгериңизге айтыңыз.

Бир эле учурда ар кандай ооруну дары препаратты узак мөөнөттүү колдонуу бөйрөккө зыян келтириши мүмкүн. Ушуга байланыштуу ар кандай ооруну басандатуучу каражаттарды бир убакта узак мөөнөттүү колдонуудан алыс болуу керек.

Ибупрофенди колдонууда көрүү курчтугунун төмөндөшүнүн айрым учурлары кабарланган, ошондуктан көрүүнүн бузулушу тууралуу дарыгерге билдирүү керек.

Башка препараттар жана Ибуфен Ультра препараты

Сизди дарылаган дарыгериңизге же дарыкана кызматкерине айтыңыз, сиз эмнени кабыл алып жатканыңыз, жакында кабыл алганыңыз же башка дарыларды кабыл ала баштаганыңыз жөнүндө:

- ибупрофен же башка ССКП камтыган башка дары препараттары, анын ичинде рецепти жок сатылуучу дарылар
- диуретиктер (сууну чыгарууга жардам берет)
- антикоагулянттар (мисалы, варфарин сыяктуу кан суюлтуучу каражаттар)
- артериялык кан басымын төмөндөтүүчү препараттар (мисалы, каптоприл, атенолол, лозартан)
- литий (маанайдын бузулушу үчүн)
- метотрексат (псориаз, артрит же залалдуу шишик үчүн)
- зидовудин (АИВ-инфекциясын дарылоо үчүн)
- кортикостероиддер (сезгенүүгө каршы препараттар)
- жүрөк гликозиддери (жүрөк оорулары үчүн)
- фенитоин (эпилепсияга каршы дары препараты)
- циклоспорин (жалгаштыруудан кийин органды четке кагуу үчүн)

- мифепристон (кош бойлуулукту токтотуу үчүн)
- хинолон катарындагы антибиотиктер (инфекцияларды дарылоо үчүн)
- кайтарымдуу алынган серотониндин селективдүү ингибиторлор тобунан антидепрессанттар
- антитромбоциттардык препараттар, мисалы, дипиридамол, клопидогрел
- пробенецид, сульфипиразон (подаграны дарылоо үчүн колдонулган препараттар)
- пероралдык гипогликемиялык препараттар (мисалы, глимепирид)
- вориконазол же флуконазол (мите козу карынга каршы препараттар)
- колестирамин (жогорку холестерол менен ооругандарга колдонулат).

Эгерде жогоруда айтылгандардын бири сизге тиешелүү болсо, дарыгерге же фармацевтке айтыңыз.

Кош бойлуулук, эмчек эмизүү жана фертилдүүлүк

Эгер сиз кош бойлуу же эмчек эмизген болсоңуз, кош бойлуу болуп калдым деп ойлосоңуз же кош бойлуу болууну пландап жатсаңыз препаратты колдонуунун алдында дарыгерге же дарыкана кызматкерине кайрылыңыз.

Кош бойлуулук

Ибуфен Ультра препараттын кош бойлуулуктун акыркы 3 айында колдонууга болбойт, анткени ал төрөлө элек балага зыян келтириши же төрөт учурунда көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Препарат төрөлө элек баланын бөйрөк жана жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүн. Бул эненин жана анын баласынын кан агуу тенденциясына таасирин тийгизиши мүмкүн жана төрөт күтүлгөндөн кеч же узакка созулушу мүмкүн.

Ибуфен Ультраны кош бойлуулуктун алгачкы 6 айында өтө зарылчылыксыз жана дарыгердин сунушу менен кабыл албаңыз. Бул мезгилде же кош бойлуу болууга аракет кылып жатканда дарылоо керек болсо, мүмкүн болушунча кыска убакытка эң төмөнкү дозасын колдонуңуз. Кош бойлуулуктун 20-жумасынан баштап бир нече күндөн ашык кабыл алынган Ибуфен Ультра препараттын төрөлө элек баланын бөйрөк оорусуна алып келиши мүмкүн, бул баланы курчап турган амниотикалык суюктуктун аз болушуна (олигогидрамниоз) же баланын жүрөгүнүн кан тамырларынын (артериалык агым) тарышына алып келиши мүмкүн. Дарылоо бир нече күндөн ашык талап кылынса, дарыгер кошумча мониторинг сунуш кылышы мүмкүн.

Эмчек эмизүү

Ибупрофен эмчек сүтү менен аз санда бөлүнүп чыгат, бирок балага тийгизген терс таасири аз күмөндүү.

Фертилдүүлүк

Ибупрофен аялдардын репродуктивдүү функциясына тоскоол боло турган препараттардын тобуна кирет. Бул дары препараты менен дарылоо токтотулгандан кийин толугу менен калыбына келет. Маал-маалы менен колдонулган бул дары препараты кош бойлуу болуу мүмкүнчүлүгүңүзгө таасир этпейт, бирок сиз кош бойлуу боло албасаңыз, бул препаратты колдонуудан мурун дарыгериниз менен сүйлөшүңүз.

Унаа каражаттарын айдоо жана механизмдер менен иштөө

Бул дары препараты чарчоого жана баш айланууга алып келиши мүмкүн. Эгерде сизде башыңыз айланса, унаа айдоодон же механизмдерди иштетүүдөн алыс болуңуз.

Ибуфен Ультра препаратынын курамында сорбитол (E 420), суюк мальтитол (E 965) жана калий бар.

Препаратта 28,8 мг сорбитол жана 15 мг суюк мальтитол камтылган. Эгер сизде кээ бир канттарга көтөрө албастык бар болсо, бул дары препаратын ичерден мурун дарыгерге кайрылыңыз.

Препараттын курамынын ар бир капсуласында 0,27 ммоль (10,5 мг) калий бар, аны бөйрөк функциясы бузулган бейтаптарда жана диетадагы калийдин мазмунун көзөмөлдөгөн бейтаптарда эске алуу керек.

3. Ибуфен Ультра препаратын кабыл алуу

Дары препаратын ар дайым таңгакчага ылайык же дарыгердин же фармацевттин сунуштарына ылайык колдонуңуз. Эгерде шектенсеңиз, дарыгеринизге же фармацевтке кайрылыңыз.

Сунушталган доза

Чондор жана 12 жаштан баштап өспүрүмдөр (40 кг жогору): бир жолку доза 200-400 мг (1-2 капсула). Андан кийин, зарыл болсо, ар бир 4-6 саатта 1-2 капсула. Максималдуу суткалык дозасы - 6 капсула (1200 мг ибупрофен).

Бейтаптардын өзгөчө топтору:

- **Улгайган курактагы бейтаптар:** Дозаны тууралоо талап кылынбайт. Улгайган бейтаптар мүмкүн болуучу жагымсыз реакцияларга кылдат мониторинг жүргүзүүнү талап кылат.
- **Бөйрөк функциясынын бузулушу бар бейтаптар:** Жеңил же орточо бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптарда дозасын тууралоо талап кылынбайт (бөйрөк функциясынын оор бузулушу бар бейтаптар, «Каршы көрсөтмөлөр» бөлүмүн караңыз).
- **Боор функциясынын бузулушу бар бейтаптар:** Боордун жеңил же орточо даражадагы бузулушу бар бейтаптарда дозасын өзгөртүү талап кылынбайт (боордун функциясынын оор бузулушу бар бейтаптар үчүн «Каршы көрсөтмөлөр» бөлүмүн караңыз).

Колдонуу боюнча көрсөтмөлөр

Ичип кабыл алуу үчүн. Капсуланы бир аз суу менен бүтүндөй жутуу керек. Капсулаларды тиштөөгө болбойт, сорууга жана чайноого болбойт. Балдарга дары препаратын колдонууда так дозалоо үчүн баланын салмагын эске алуу керек.

Дарылоонун узактыгы

Бул дары препараты 3 күндөн ашык керек болсо же өзүңүздү начар сезсеңиз, дарыгерге кенеш алууга кайрылыңыз.

Симптомдорду жеңилдетүү үчүн зарыл болгон эң кыска мөөнөттө препаратты

минималдуу эффективдүү дозада колдонуу жагымсыз реакциялардын пайда болуу коркунучун азайтат. Эгерде сизде инфекция болсо, симптомдор (мисалы, ысытма жана оору) кетпесе же күчөп кетпесе, дароо дарыгерге кайрылышыңыз керек (2-бөлүмдү караңыз).

Эгерде сиз Ибуфен Ультраны керектөөдөн көбүрөөк кабыл алсаңыз

Эгер сиз дары препаратын талап кылынгандан көбүрөөк кабыл алган болсоңуз, же балаңыз бул дары препаратын кокустан кабыл алган болсо, мүмкүн болуучу кооптуулуктар жана кандай кадамдарды жасоо керектиги боюнча кеңеш алуу үчүн дарыгеринизге же жакынкы ооруканага кайрылыңыз.

Дозаны ашыкча колдонуунун симптомдору жүрөк айлануу, ичтин оорушу, кусуу (кээде кан менен коштолгон), баш оору, кулактын чуулдашы, баш аламандык жана көздүн титирөөсү болушу мүмкүн.

Дары препаратын жогорку дозада кабыл алууда уйкучулук, көкүрөктүн оорушу, жүрөктүн кагуусу, эсин жоготуу, калтыроолор (негизинен балдарда), жалпы алсыздык жана баш айлануу, заарадагы кан, муздак сезим жана дем алуунун кыйындашы сыяктуу симптомдор пайда болот.

Ибуфен Ультра препаратын кабыл алууну унутуп калсаңыз

Эгерде сиз дозаны алууну унутуп калсаңыз, кийинки дозаны белгиленген убакта кабыл алыңыз, эгерде акыркы доза кеминде 4 саат мурун кабыл алынган болсо. Өткөрүлгөн дозанын ордун толтуруу үчүн эки эселенген дозаны кабыл албаңыз.

Дары препаратын колдонуу боюнча суроолоруңуз болсо, дарыгерге же фармацевтке кайрылыңыз.

4. Мүмкүн болгон жагымсыз реакциялар

Бардык дары препараттары сыяктуу эле, бул дары да жагымсыз таасирлерди жаратышы мүмкүн, бирок алар бардыгында эле пайда боло бербейт.

Эң кеңири таралган жагымсыз реакция **ашказандын дүүлүгүү болуп саналат**, ал тамак сиңирүү жана зарна сыяктуу көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.

Ибуфен Ультра дары препаратын колдонууну токтотуңуз жана төмөндөгүлөрдүн бири болуп калса, дароо медициналык жардамга кайрылыңыз:

- өтө сейрек байкалган **ашказан жарасынын күчөшү, ашказан-ичегиден кан агуу жана тешилүү** (10 000ден 1 адамдан аз болушу мүмкүн):
 - заңда кандын болушу
 - кара чайыр сымал заңдын болушу
 - кан кусуу же кофе талканына окшош кара зат
- **олуттуу аллергиялык реакциялар** (10 000 адамдын 1ден азында пайда болушу мүмкүн):
 - беттин, тилдин же тамактын шишимиги
 - энтигип дем алуу; жүрөктүн кагышын жогорулатуу; кан басымынын олуттуу төмөндөшү

- бронхиалдык астманын күчөшү, бронхоспазм, муунтуу, ышкырып дем алуу;
- **оор тери реакциясы:**
 - Стивенс-Джонсон синдрому, полиморфтук эритема жана уулуу эпидермалдык некролиз (кызаруу жана ыйлаакчалуу исиркектер, теринин куудурашы; ооздо, тамакта, мурунда, жыныс органдарында жана конъюнктиванда жаралар), алар өтө сейрек кездешет (азыраак учурларда пайда болушу мүмкүн 10000ден 1 адамда)
 - DRESS синдрому (эозинофилия жана системалык симптомдор менен дары реакциясы). DRESS синдромунун белгилерине териде исиркектер, калтыроо, лимфа түйүндөрүнүн кеңейиши, кандагы эозинофилдердин санынын көбөйүшү (ак кан клеткасынын бир түрү) кирет (белгисиз, ооруну колдо болгон маалыматтардын негизинде аныктоо мүмкүн эмес)
 - теринин бетинен жогору чыгып турган кызыл кабыкчалуу кеңири таралган исиркектер, негизинен тери бүктөмдөрүндө, тулку боюнда жана үстүнкү буттарында жайгашкан ыйлаакчалар, дарылоонун башталышында калтыроо менен коштолгон (курч жайылган экзантематоздуу пустулез) (жеткиликтүү маалыматтар боюнча белгисиз, пайда болуу жыштыгын аныктоо мүмкүн эмес), ошондой эле 2-бөлүмдү караңыз
- өтө сейрек кездешкен **бөйрөк алсыздыгы (10 000 адамдын 1ден азында пайда болушу мүмкүн):**
 - азыраак же көбүрөөк заара чыгаруу
 - бүдөмүк заара же заарадагы кан
 - белдин оорушу жана/же шишимик (айрыкча, буттарда)
- **мээ кабыкчасынын сезгениши (асептикалык менингит), өтө сейрек байкалган (10 000ден 1 адамдан аз пайда болушу мүмкүн):**
 - моюндун катуулугу, баш оору, жүрөк айлануу, кусуу, калтыроо жана багытты жоготуу
- **кандын морфологиялык параметрлеринин өзгөрүшү:** анемия (аз кандуулук), лейкопения (кандагы лейкоциттердин деңгээлинин төмөндөшү), тромбоцитопения (кандагы тромбоциттердин деңгээлинин төмөндөшү), панцитопения (кан клеткаларынын үч түрүнүн тең азайышы - кызыл кан клеткалар, лейкоциттер жана тромбоциттер), агранулоцитоз (кандагы гранулоциттер деңгээлинин төмөндөшү) өтө сейрек байкалган (10 000ден 1 адамдан азында пайда болушу мүмкүн):
 - жогорку дене табы бар катуу тамак оору
 - ооз көндөйдө үстүртөн жаралар
 - суук тийүү
 - айкын алсыздык
 - көгөрүүнүн пайда болуусунун же кан агуунун түшүндүрүлбөгөн жеңилдиги, мисалы, мурундан.

Ибуфен Ультра дары препаратын кабыл алууда пайда болушу мүмкүн болгон башка жагымсыз реакциялар

Сейрек (100 адамдан 1ден көп эмесинде пайда болушу мүмкүн)

- баш оору

- ашказандын бузулушу, ичтин оорушу, жүрөк айлануу, ичтин көбүшү
- кычышуу түрүндө аллергия, тери исиркектер (бөрү жатыш), ар кандай тери исиркектер.

Сейрек (1000 адамдан 1ден азында пайда болушу)

- баш айлануу, уйкусуздук, толкундануу, дүүлүгүү, чарчоо
- психотикалык реакция, депрессия
- диарея, ичтин катуу көөп кетиши, ич катуу, кусуу.

Өтө сейрек кездешет (10 000 адамдын 1ден азында пайда болушу мүмкүн)

- нервдүүлүк
- көрүүнүн начарлашы
- кулактын чуулдашы жана баш айлануу
- шишимик, артериялык кан басымынын жогорулашы жана жүрөк жетишсиздиги (ССКП тобунан дары препараттарды колдонуудан улам)
- бронхиалдык астма жана бронхоспазмдын күчөшү
- колиттин жана Крон оорусунун күчөшү
- ашказан жарасы, ашказандан кан агуу, ашказан былжыр челинин сезгениши (гастрит), жара менен ооздун былжыр челинин сезгениши (жаралуу стоматит)
- боордун функциясынын бузулушу, өзгөчө узак мөөнөттүү колдонууда, гепатит жана сарык
- бөйрөк функциясынын бузулушу
- суу чечек менен ооруган бейтаптар теринин жана жумшак ткандардын олуттуу инфекцияларын пайда кылышы мүмкүн
- лабораториялык изилдөөлөрдө гематокрит жана гемоглобин концентрациясынын төмөндөшү.

Жыштыгы белгисиз (жыштык жеткиликтүү маалыматтардын негизинде аныктоо мүмкүн эмес)

- тери жарыкка сезгич болуп калат.

Жагымсыз реакциялар жөнүндө кабарлоо

Эгерде сизде кандайдыр бир керексиз реакциялар байкалса, дарыгерге же фармацевтке кайрылыңыз. Бул ошондой эле кошумча баракчанын көрсөтүлбөгөн ар кандай жагымсыз реакцияларды камтыйт. Сиз ошондой эле жагымсыз реакциялар жөнүндө түздөн-түз кабарлай аласыз (төмөндө караңыз). Жагымсыз реакциялар жөнүндө билдирүү менен сиз дары препаратынын коопсуздугу жөнүндө көбүрөөк маалымат берүүгө жардам бере аласыз.

Беларусь Республикасы

УИ «Беларусь Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Саламаттык сактоонун экспертиза жана тестирилөө борбору»

Дареги: 220037, Минск, Товарищеский проспектиси, 2а

Фармакологиялык көзөмөл бөлүмүнүн телефону/факсы: +375 (17) 242 00 29

Электрондук дареги: rceth@rceth.by

Сайт: <http://www.rceth.by/>

Кыргыз Республикасы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти

Дареги: 720044, Бишкек ш., 3-линия көч., 25

Тел: +996 (312) 21-92-88,

«Тез байланыш» телефону 008 800 26 26

Тел. факс: +996 (312) 21-05-08

Электрондук дареги: dlsmi@pharm.kg

Сайт: <http://www.pharm.kg/>

5. Ибуфен Ультра препаратын сактоо

Дары препаратын балдар жетпеген жерде жана бала көрө албагыдай кылып сактаңыз. Жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин дары препаратын колдонууга болбойт (жарактуулук мөөнөтү) таңгагында көрсөтүлгөн. Жарактуулук мөөнөтү айдын акыркы күнү болуп саналат.

Нымдан жана жарыктан коргоо үчүн оригиналдуу таңгагында, 25°C дан ашпаган аба табында сактаңыз.

Препаратын канализацияга ыргытпаңыз (төкпөңүз). Керексиз болгон дарыны кантип жок кылууну (жок кылууну) дарыкана кызматкеринен сураңыз. Бул чаралар айлана-чөйрөнү коргоого мүмкүндүк берет.

6. Таңгакчанын камтылышы жана башка маалымат

Ибуфен Ультра дары препараты

- Таасир берүүчү зат болуп ибупрофен саналат. Ар бир капсулада 200 мг ибупрофен бар.
- Башка көмөкчү заттар болуп төмөнкүлөр саналат: макрогол 600, калий гидроксиди, тазаланган суу; чел кабык: суюк сорбитол, кристаллдашпаган, суюк малтитол, желатин.

Ибуфен Ультра препаратынын сырткы көрүнүшү жана таңгакчанын курамы

Ачык сары жумшак желатин капсулалар, сүйрү формада, жабышчаак, түссүз суюктукту камтыйт.

ПВХ/ПВДХ жана алюминий фольгадан жасалган блистерде 10 капсуладан. 10 (1 блистер) же 20 (2 блистер) капсулалар картон кутуга кошумча баракчасы менен бирге салынган.

Каттоо күбөлүк ээси

«ПОЛЬФАРМА» АК фармацевтикалык заводу

Пельплиньска көч., 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

Телефон: +48 58 5631600

Факс: +48 58 5622353

Электрондук дареги: phv@polpharma.com

Өндүрүүчү

«ПОЛЬФАРМА» АК фармацевтикалык заводу
Серадзеги Медана бөлүмү
Владислава Локетка көч., 10, 98-200 Серадз, Польша

Препарат жөнүндө ар кандай маалымат алуу үчүн, ошондой эле арыз-доолор болгон учурда, сиз каттоо күбөлүк ээсинин жергиликтүү өкүлүнө кайрылышыңыз керек:

Беларусь Республикасы

ЖЧК «Акрихин БиУай»

7-409, Бехтерев көч., 220026 Минск

Телефон/факс: +375 17 368 59 98

Электрондук дареги: sergei.levuj@akrikhin.by

Кыргыз Республикасы

АК «Химфармдын» Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү

Бишкек, Орозбеков көч., 52-54, 3-кабат

Телефон номери: +996312975635

Электрондук дареги: pvh-kg@santo.kz

Кошумча баракча каралып чыккан

Башка маалымат булактары

Бул препарат тууралуу кеңири маалымат Биримдиктин веб-сайтында камтылган
<http://ees.eaeunion.org/>.