

## Paciento budrumo kortelė

**Mibrex 2,5 mg** (paskirtą dozę pažymėti varnele)

**Mibrex 10 mg** (paskirtą dozę pažymėti varnele)

**Mibrex 15 mg** (paskirtą dozę pažymėti varnele)

**Mibrex 20 mg** (paskirtą dozę pažymėti varnele)

♦ **Visada turėkite šią kortelę.**

♦ **Parodykite šią kortelę kiekvienam gydytojui arba odontologui prieš paskiriant Jums gydymą.**

### Aš vartoju antikoaguliantą Mibrex (rivaroksabaną)

Vardas, pavardė:

Adresas:

Gimimo data:

Svoris:

Kiti vaistai / būklės:

### Skubos atveju praneškite:

Gydytojo v., pavardė:

Gydytojo tel.:

Gydytojo antspaudas:

### Taip pat praneškite:

Vardas, pavardė:

Telefonas:

Giminystės ryšys:

### Informacija sveikatos priežiūros specialistams:

♦ TNS reikšmių nustatyti nereikia, nes tai nėra patikimas tyrimo metodas Mibrex antikoaguliaciniam aktyvumui įvertinti.

### Ką turėčiau žinoti apie Mibrex?

♦ Mibrex suskystina kraują, o tai apsaugo nuo pavojingų kraujo krešulių susidarymo.

♦ Mibrex reikia vartoti tiksliai kaip nurodė gydytojas. Kad geriausiai apsisaugotumėte nuo kraujo krešulių susidarymo, **niekada nepraleiskite dozes.**

♦ Negalima nustoti vartoti Mibrex prieš tai nepasitarus su gydytoju, nes gali padidėti kraujo krešulių susidarymo rizika.

♦ Jeigu vartojate, neseniai vartojote ar ketinate pradėti vartoti kitų vaistų, prieš pradėdami vartoti Mibrex apie tai pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui.

♦ Prieš atliekant bet kokią chirurginę ar invazinę procedūrą, savo sveikatos priežiūros specialistui pasakykite, kad vartojate Mibrex.

### Kada turėčiau kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą?

Vartojant kraują skystinantį vaistą Mibrex, svarbu žinoti, koks yra jo šalutinis poveikis. Dažniausias šalutinis poveikis yra kraujavimas. Jei žinote, kad Jums yra kraujavimo rizika, negalima pradėti vartoti Mibrex, prieš tai nepasitarus su gydytoju. Nedelsdami pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui, jeigu pasireiškia tokie kraujavimo požymiai arba simptomai:

♦ skausmas

♦ tinimas arba nemalonus jausmas

♦ galvos skausmas, svaigulys arba silpnumas

♦ neįprastos mėlynės, kraujavimas iš nosies, kraujavimas iš dantenu, ilgai nepraeinantis kraujavimas įsipjovus

♦ gausesnis nei įprastai mėnesinių kraujavimas arba kraujavimas iš makšties

♦ kraujas šlapime, kuris gali būti rausvos arba rudos spalvos, raudonos arba juodos spalvos išmatos

♦ kraujo atkosėjimas arba vėmimas krauju ar į kavos tirščius panašiu skrandžio turiniu.

**Kaip vartoti Mibrex?**

- ◆ Norint užtikrinti optimalią apsaugą, Mibrex
  - 2,5 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
  - 10 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
  - 15 mg tabletes reikia vartoti valgio metu;
  - 20 mg tabletes reikia vartoti valgio metu.

2023 m. rugsėjo mėn.