

Paciento budrumo kortelė

Rivaroxaban Polpharma 10 mg (paskirtą dozę pažymėti varnele)

Rivaroxaban Polpharma 15 mg (paskirtą dozę pažymėti varnele)

Rivaroxaban Polpharma 20 mg (paskirtą dozę pažymėti varnele)

♦ **Visada turėkite šią kortelę.**

♦ **Parodykite šią kortelę kiekvienam gydytojui arba odontologui prieš paskiriant Jums gydymą.**

Aš vartoju antikoagulantą **Rivaroxaban Polpharma (rivaroksabaną)**

Vardas, pavardė:

Adresas:

Gimimo data:

Svoris:

Kiti vaistai / būklės:

Skubos atveju praneškite:

Gydytojo v., pavardė:

Gydytojo tel.:

Gydytojo antspaudas:

Taip pat praneškite:

Vardas, pavardė:

Telefonas:

Giminystės ryšys:

Informacija sveikatos priežiūros specialistams:

♦ TNS reikšmių nustatyti nereikia, nes tai nėra patikimas tyrimo metodas Rivaroxaban Polpharma antikoaguliaciniam aktyvumui įvertinti.

Ką turėčiau žinoti apie Rivaroxaban Polpharma?

♦ Rivaroxaban Polpharma suskystina kraują, o tai apsaugo nuo pavojingų kraujo krešulių susidarymo.

♦ Rivaroxaban Polpharma reikia vartoti tiksliai kaip nurodė gydytojas. Kad geriausiai apsisaugotumėte nuo kraujo

krešulių susidarymo, **niekada nepraleiskite dozes.**

♦ Negalima nustoti vartoti Rivaroxaban Polpharma prieš tai nepasitarus su gydytoju, nes gali padidėti kraujo krešulių susidarymo rizika.

♦ Jeigu vartojate, neseniai vartojote ar ketinate pradėti vartoti kitų vaistų, prieš pradėdami vartoti Rivaroxaban Polpharma apie tai pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui.

♦ Prieš atliekant bet kokią chirurginę ar invazinę procedūrą, savo sveikatos priežiūros specialistui pasakykite, kad vartojate Rivaroxaban Polpharma.

Kada turėčiau kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą?

Vartojant kraują skystinantį vaistą Rivaroxaban Polpharma, svarbu žinoti, koks yra jo šalutinis poveikis. Dažniausias šalutinis poveikis yra kraujavimas. Jei žinote, kad Jums yra kraujavimo rizika, negalima pradėti vartoti

Rivaroxaban Polpharma, prieš tai nepasitarus su gydytoju. Nedelsdami pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui, jeigu pasireiškia tokie kraujavimo požymiai arba simptomai:

♦ skausmas

♦ tinimas arba nemalonus jausmas

♦ galvos skausmas, svaigulys arba silpnumas

♦ neįprastos mėlynės, kraujavimas iš nosies, kraujavimas iš dantenu, ilgai nepraeinantis kraujavimas įsipjovus

♦ gausesnis nei įprastai mėnesinių kraujavimas arba kraujavimas iš makšties

- ♦ kraujas šlapime, kuris gali būti rausvos arba rudos spalvos, raudonos arba juodos spalvos išmatos
- ♦ kraujo atkosėjimas arba vėmimas krauju ar į kavos tirščius panašiu skrandžio turiniu.

Kaip vartoti Rivaroxaban Polpharma?

- ♦ Norint užtikrinti optimalią apsaugą, Rivaroxaban Polpharma
 - 10 mg tabletės galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
 - 15 mg tabletės reikia vartoti valgio metu;
 - 20 mg tabletės reikia vartoti valgio metu.

2024 m. rugsėjo mėn.