

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

SIRUPUS PINI COMPOSITUS sīrups

Pini extractum fluidum/Calcii lactas/Foeniculi tinctura/Chelidonii herbae extractum fluidum/Codeini phosphas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles ir pieejamas bez receptes.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabāji šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicāji ārstam vai farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējies ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 3 - 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Sirupus Pini Compositus un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Sirupus Pini Compositus lietošanas
3. Kā lietot Sirupus Pini Compositus
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Sirupus Pini Compositus
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sirupus Pini Compositus un kādam nolūkam to lieto

Sirupus Pini Compositus ir klepu nomācošs un atkrēpošanu veicinošs līdzeklis.

Sirupus Pini Compositus lieto kā palīg līdzekli augšējo elpceļu iekaisuma slimību, kas saistītas ar sausu un mokošu klepu, ārstēšanai.

Ja pēc 3 - 5 dienām Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Sirupus Pini Compositus lietošanas

Nelietojiet Sirupus Pini Compositus šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām (priežu šķidro ekstraktu, kalcija laktātu, fenheļa tinktūru, strutenes lakstu šķidro ekstraktu, kodeīna fosfātu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir bronhiālā astma vai nosliece uz bronhospazmām;
- ja Jums ir akūta elpošanas mazspēja;
- ja Jums ir aknu parenhīmas bojājums;
- ja Jūsu bērns ir jaunāks par 12 gadiem;
- ja Jūs zināt, ka kodeīna metabolizēšana par morfinu Jūsu organismā notiek ļoti ātri;
- ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;
- ja Jūs lietojat benzodiazepīnus (lieto depresijas un citu psihotisku traucējumu ārstēšanai);
- ja Jūs lietojat miega zāles (barbiturskābes atvasinājumus).

Pusaudži no 12 gadu vecuma

Sirupus Pini Compositus nav ieteicams lietot klepus un/vai saaukstēšanās ārstēšanai pusaudžiem ar elpošanas traucējumiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sirupus Pini Compositus lietošanas konsultējies ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība nepieciešama šādos gadījumos:

- ja Jums ir aknu un/vai nieru mazspēja;
- ja Jums ir aritmija (sirdsdarbības traucējumi);
- ja Jums ir miastēnija (dažādu cēloņu izraisīts muskuļu nespēks);
- ja Jums ir žultsakmeņi;
- ja Jums ir palielināts priekšdziedzeris.

Kodeīns aknās enzīma ietekmē tiek pārveidots morfinā. Morfīns ir viela, kas nodrošina kodeīna darbību. Dažiem cilvēkiem ir atšķirīga šī enzīma darbība, un tās var ietekmēt cilvēku dažādos veidos. Dažiem cilvēkiem morfīns neveidojas vai veidojas ļoti nelielā daudzumā, un tas neietekmēs klepus simptomus. Citiem cilvēkiem ir lielāka būtisku blakusparādību rašanās iespējamība, jo veidojas ļoti liels daudzums morfinā. Ja pamanāt jebkuru no šādām blakusparādībām, Jums jāpārtrauc lietot šīs zāles un nekavējoties jākonsultējas ar ārstu: lēna vai sekla elpošana, apmulsums, miegainība, sašaurinātas acu zīlītes, slikta dūša vai vemšana, aizcietējums, ēstgribas trūkums.

Parādoties paaugstinātas jutības simptomiem, piemēram, izsitumiem, niezei vai ekzēmai, nekavējoties jāpārtrauc Sirupus Pini Compositus lietošana.

Ilgstošas lietošanas laikā jāievēro piesardzība, jo iespējami aknu bojājumi šo zāļu sastāvā ietilpstošā strutenes auga ekstrakta dēļ.

Ilgstoša šo zāļu lietošana, it īpaši lielās devās, var izraisīt atkarību.

Citas zāles un Sirupus Pini Compositus

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat:

- ciprofloksacīnu (antibakteriāls līdzeklis infekciju ārstēšanai);
- benzodiazepīna grupas antidepresantus (lieto depresijas un citu psihotisku traucējumu ārstēšanai);
- miega zāles (barbiturskābes atvasinājumus);
- neiroleptiskos līdzekļus (lieto šizofrēnijas ārstēšanai);
- klonidīnu (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai);
- zāles, kas satur opioīdus (lieto sāpju atvieglošanai);
- pretsēnīšu līdzekļus (piemēram, itrakonazolu, ko lieto sēnīšinfekciju ārstēšanai);
- pretvīrusu līdzekļus (zāles vīrusu infekcijas ārstēšanai);
- metoklopramīdu (pretvemšanas līdzeklis);
- antacīdus (skābi neitralizējošas zāles).

Sirupus Pini Compositus kopā ar uzturu un dzērienu

Sirupus Pini Compositus jālieto pēc ēdienreizēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sirupus Pini Compositus nedrīkst lietot grūtnieces.

Nelietojiet Sirupus Pini Compositus laikā, kamēr barojat bērnu ar krūti. Kodeīns un morfīns nonāk mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var ietekmēt spēju veikt darbības, kur nepieciešama uzmanība, piemēram, transportlīdzekļa vadīšana vai mehānismu apkalpošana.

Vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, Jums jāņem vērā, ka viena pieaugušo deva (15 ml) atbilst 8 ml vīna vai 21 ml alus.

Sirupus Pini Compositus satur saharozi un etilspirtu

Sirupus Pini Compositus satur 12 g saharozes 15 ml sīrupa (36 g saharozes 45 ml sīrupa).

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. Tas jāievēro pacientiem ar cukura diabētu. Var kaitēt zobiem.

Šīs zāles satur 840 mg alkohola (etilspirta) katrā 15 ml sīrupa. Šo zāļu daudzums ir līdzvērtīgi 21 ml alus vai 8 ml vīna katrā 15 ml sīrupa.

Alkohola daudzums zālēs var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat citas zāles.

Ja Jums ir atkarība no alkohola, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

3. Kā lietot Sirupus Pini Compositus

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājjiet ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva ir sekojoša:

- pieaugušie un pusaudži, kuri vecāki par 12 gadiem: 1 karote (15 ml) sīrupa trīs reizes dienā;
- gados vecāki pacienti: deva ir tāda pati kā pieaugušajiem, tomēr var būt nepieciešams samazināt devu. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, ja Jūs esat gados vecāks pacients.

Sirupus Pini Compositus jālieto pēc ēdienreizēm.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 3 - 5 dienām, Jums jāsaazinās ar ārstu.

Ja Jums liekas, ka Sirupus Pini Compositus iedarbība ir par stipru vai vāju, lūdzu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Sirupus Pini Compositus vairāk nekā noteikts

Līdz šim nav ziņots par Sirupus Pini Compositus pārdozēšanas gadījumiem.

Lietojot ievērojami lielākas devas kā ieteicamās, iespējams elpošanas nomākums.

Saistībā ar kodeīna pārdozēšanu iespējami sekojoši simptomi: pazemināts asinsspiediens, drudzis, pazemināta ķermeņa temperatūra, krampji, nervozitāte, reibonis, miegainība, nespēks, palēnināta sirdsdarbība, sirdsklauves, elpošanas traucējumi un bezsamaņa. Akūtas pārdozēšanas gadījumā iespējams acu, ādas kuņģa – zarnu trakta un elpceļu kairinājums, bet hroniskas pārdozēšanas gadījumā iespējamās paaugstinātas jutības reakcijas un kodeīna atkarība.

Ja esat lietojis vairāk Sirupus Pini Compositus nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Sirupus Pini Compositus

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Sirupus Pini Compositus

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājjiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šo zāļu panesamība ir laba.

Blakusparādību sastopamības biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Iespējamās sekojošas blakusparādības:

- pacientiem, kuri jutīgi pret šo zāļu aktīvajām vielām, iespējamās alerģiskas reakcijas;
- elpošanas nomākums, plaušu tūska;
- slikta dūša, vemšana, aizcietējums;
- miega traucējumi, galvassāpes un reibonis;
- aknu bojājums, it īpaši pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto zāles, kas ietekmē aknu darbību.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sirupus Pini Compositus

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sirupus Pini Compositus satur

- Aktīvās vielas 5 ml sīrupa ir 424 mg priežu šķidrā ekstrakta DER 1:1.6 (ekstraģents: 90 % etilspirts), 64 mg kalcija laktāta, 64 mg fenheļa tinktūras (ekstraģents: 90 % etilspirts), 10 mg strutenes lakstu šķidrā ekstrakta DER 1:1 (ekstraģents: 60 % etilspirts) un 3 mg kodeīna fosfāta.
- Citas sastāvdaļas ir fosforskābe (85 %), saharoze un attīrīts ūdens.

Sirupus Pini Compositus ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, dzeltenbrūns sīrups ar priežu un fenheļa smaržu.

Primārais iepakojums ir oranža stikla pudelīte, kas satur 150 g (116 ml) sīrupa. Pudelīte ir noslēgta ar skrūvējamu polietilēna vāciņu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Polija

Ražotājs

Herbapol Lublin S.A.

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 11/2020