

# Ranigast<sup>®</sup> S-O-S

medicinos priemonė

Kramtomosios tabletės

- **PALENGVINA GASTROEZOFAGINIO REFLUKSO SIMPTOMUS (pavyzdžiui, rėmenį ir skrandžio skausmą)**
- **MAŽINA RŪGŠTINGUMĄ**
- **APSAUGO SKRANDŽIO GLEIVINĘ**

## 1. Identifikavimas, sudėtis ir paskirtis

Ranigast S-O-S yra skirtas gastroezofaginio reflukso simptomų, pavyzdžiui, rėmens ir skrandžio skausmo, malšinimui.

Ranigast S-O-S leidžia kontroliuoti padidėjusį skrandžio rūgštingumą, išvengti deginimo pojūčių, skrandžio skausmo ir dispepsijos.

Ranigast S-O-S yra veiksminga priemonė, nesvarbu, dėl kokios priežasties kilo problema. Be to, jis gali būti vartojamas kaip pagalbinė priemonė gastritui sergantiems pacientams.

## 1.1 Veikimo mechanizmas

Ranigast S-O-S sudėtyje yra skirtingų skrandžio aplinkoje sinergiškai veikiančių medžiagų derinys. Ypatinga sudėtis, kurioje yra natrio alginato, algininės rūgšties, natrio hidrokarbonato, kalcio karbonato, užtikrina greitą poveikį.

Alginatai yra ypatingi, iš tam tikrų rūšių dumblių išskirti polisacharidai. Patekusios į rūgštinę skrandžio aplinką, šios skaidulos labai greitai pradeda formuoti gelį, o šis padengia ir apsaugo skrandžio gleivinę.

Hidrokarbonato ir karbonato derinys neutralizuoja rūgštinę skrandžio terpę. Be to, reaguojant su vandenilio chlorido rūgštimi susidaro anglies dioksido burbuliukai sulaikomi alginato gelyje, šis virsta putomis, plūduriuojančiomis skrandžio sulčių paviršiuje, ir sumažina reflukso epizodų kiekį.

## 1.2 Sudėtis

Kiekvienoje tabletėje yra: 200 mg natrio alginato, 50 mg algininės rūgšties, 80 mg natrio hidrokarbonato, 140 mg kalcio karbonato.

## Pagalbinės medžiagos

Manitolis, sukralozė, silicio dioksidas, augalinis magnio stearatas, glicerolio behenatas, imbierių ekstraktas, imbierių eterinis aliejus, citrinių kvapijosi medžiaga, mėtų kvapijosi medžiaga.

## 2. Pakuotė

Kiekvienoje dėžutėje yra 12 arba 24 tabletės.

## 3. Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusiems ir paaugliams (12 metų amžiaus ir vyresniems): rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes, po to galima užgerti šiek tiek vandens.

Vaikams (6-12 metų amžiaus): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę, po to galima užgerti šiek tiek vandens.

Šios dozės veiksmingai sumažina padidėjusį skrandžio rūgštingumą ir apsaugo nuo gastroezofaginio reflukso. Neviršykite rekomenduojamos dozės.

## 4. Šalutinis poveikis

Medicinos priemonės Ranigast S-O-S sudėtyje esančios medžiagos yra saugios, visiškai suderinamos ir gerai toleruojamos; tai įrodyta specialiais tyrimais. Vartojant dozes, kurių reikia norint pasiekti terapinį poveikį, pastebėtas šalutinis poveikis buvo vidurių užkietėjimas ir laikinas viduriavimas.

Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

## 5. Sąveika su maisto papildais ir vaistais

Apie medicinos priemonės Ranigast S-O-S sudėtyje esančių medžiagų sąveiką su maisto papildais nežinoma. Tačiau laikomasi bendros taisyklės, kad visus maisto papildus, įskaitant vitaminus, maistines medžiagas, žolinius ir homeopatinis vaistus, reikia suvartoti mažiausiai prieš dvi valandas iki

Ranigast S-O-S vartojimo arba praėjus dviem valandoms po pavartojimo.

## 5.1 Vaistų sąveika

Dėl Ranigast S-O-S fizinių ir cheminių ypatybių vaistas gali sulėtinti arba susilpninti kartu vartojamų medžiagų ir vaistų absorbciją. Todėl prieš pradėdami vartoti j Ranigast S-O-S panašų produktą pasitarkite su gydytoju, ypač jei vartojate kontraceptines tabletes.

Ranigast S-O-S vartoti su tokiais vaistiniais preparatais kaip omeprazolas, cimetidinas ar cisapridas kontraindikacijų nėra; bet tokiais atvejais patartina pasitarti su gydytoju.

## 6. Laikymas

Ranigast S-O-S laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginio karščio ar šviesos šaltinių.

Nevartoti, jei pakuotė pažeista. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Priemonę laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

## 7. Ispėjimai ir atsargumo priemonės

Medicinos priemonė iš esmės yra skirta vartoti vyresniems nei 18 metų amžiaus asmenims. Vis dėlto Ranigast S-O-S kartais gali vartoti vyresni nei 6 metų amžiaus vaikai arba paaugliai, tačiau įspėjama, kad vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus dozė reikia sumažinti per pusę ir priemonę vartoti, kaip rekomenduojama. Jei abejojate, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

**Nėštumo ar žindymo laikotarpiu priemonę rekomenduojama vartoti tik pasitarus su gydytoju.**

Neviršykite rekomenduojamos dozės, nes didesnis kiekis gali sukelti vidurių užkietėjimą arba laikiną viduriavimą.

Priemonės negalima vartoti esant lėtiniam vidurių užkietėjimui arba jei viduriuojama, sergant inkstų liga ar lėtiniu širdies nepakankamumu.

Ranigast S-O-S vartoti negalima ilgiau nei 30 dienų. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu po tam tikro laikotarpio vartojant priemonę simptomai nepalengvėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Kiekviena tabletė skirta vartoti tik vieną kartą. Tabletes iš lizdinės plokštelės reikia išimti iš karto prieš vartojant. Tabletes nevartokite, jei žinote, kad Jums pasireiškė padidėjęs jautrumas produkto sudėtinėms medžiagoms.

## 8. Tinkamumo laikas

Nevartokite pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui. Tinkamumo laikas taikytinas tik nepažeistai ir tinkamai laikomai pakuotei.

## 9. Atliekų tvarkymas

Pasibaigus tinkamumo laikui, priemonę reikia išmesti laikantis atliekų šalinimo reikalavimų. Produkto ar jo pakuotės niekada neišmeskite į aplinką.

 SIT srl  
Via Ariosto 50/60  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Italija

  

 +25°C 

## Platintojas:

ZF Polpharma SA  
Ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański  
Lenkija

Vėliausia peržiūra 2021 m. balandžio mėn.

ULT-005915\_2

# Ranigast<sup>®</sup> S-O-S

medicīniska ierīce

Košļājamas tabletes

- **MAZINA GASTROEZOFAGEĀLĀ ATVIŅŅA SIMPTOMUS (piemēram, grēmas un vēdersāpes)**
- **MAZINA HIPERACIDITĀTI**
- **AIZSARGĀ KUŅĀ GĻOTĀDU**

## 1. Identifikācija, sastāvs un mērķis

Ranigast S-O-S ir paredzēts gastroezofageālā skābes atviļņa simptomu, piemēram, grēmu un vēdersāpju, mazināšanai.

Ranigast S-O-S dod iespēju kontrolēt kuņģa hiperaciditāti, novēršot dedzināšanas sajūtu, vēdersāpes un dispepsiju.

Ranigast S-O-S ir efektīvs neatkarīgi no problēmas pamatcēloņa. Turklāt to var lietot arī kā papildlīdzekli pacientiem ar gastrītu.

## 1.1 Darbības mehānisms

Ranigast S-O-S satur dažādas sinerģiskas vielas, kas darbojas kuņģa vidē. Medicīniskās ierīces sastāvs - nātrija algināts, algīnskābe, nātrija bikarbonāts un kalcijs karbonāts - nodrošina ātru iedarbību.

Algināti ir īpaši, no noteikta veida algēm iegūti polisaharīdi. Nokļūstot kuņģa skābajā vidē, šīs šķiedrvielas ļoti ātri izraisa gēla veidošanos. Šis gēls pārklāj un aizsargā kuņģa gļotādu.

Bikarbonāta un karbonāta kombinācija neitralizē kuņģa skābo vidi. Turklāt oglekļa dioksīda burbulus, kas veidojas, reaģējot ar sāļsskābi, saista algināta gēls, pārveidojoties putās, kas nokļāj kuņģa sulas virsmu un mazina atviļņa epizožu skaitu.

## 1.2 Sastāvdaļas

Katrā tabletē ir 200 mg nātrija algināta, 50 mg algīnskābes, 80 mg nātrija bikarbonāta, 140 mg kalcijs karbonāta.

## Palīgvielas

Mannīts, sukraloze, silīcija dioksīds, augu izcelsmes magnija stearāts, glicerīna behenāts, ingvera ekstrakts, ingvera ēteriskā eļļa, citrona un piparmētru aromātvielas.

## 2. Iepakojums

Vienā kastītē ir 12 vai 24 tabletes.

## 3. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: ieteicams lietot 2 tabletes pēc galvenās maltītes, pēc tam var uzdzert nēdaudz ūdens.

Bērniem (6-12 gadi): ieteicams lietot vienu tableti pēc galvenās maltītes, pēc tam var uzdzert nēdaudz ūdens.

Šīs devas efektīvi mazina kuņģa hiperaciditāti un novērš gastroezofageālo atviļņi. Nepārsniedz ieteikto devu.

## 4. Blakusparādības

Medicīniskās ierīces Ranigast S-O-S sastāvdaļas ir drošas, pilnīgi bioloģiski sadērigas un ar ļābu panesamību, kas pierādīts specifiskās pārbaudēs.

Lietojot terapeitiskā efekta sasniegšanai nepieciešamās devās, blakusparādības, par kurām tika ziņots, bija aizcietējums vai īslaicīga caureja.

Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

## 5. Mijiedarbība ar uztura bagātinātājiem un zālēm

Medicīniskās ierīces Ranigast S-O-S sastāvdaļu mijiedarbība ar uztura bagātinātājiem nav zināma. Taču parasti visi uztura bagātinātāji, to vidū vitamīni, uzturvielas, augu izcelsmes un homeopātiskie līdzekļi jālieto vismaz divas stundas pirms vai divas stundas pēc medicīniskās ierīces Ranigast S-O-S lietošanas.

## 5.1 Zāļu mijiedarbība

Fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ Ranigast S-O-S var aizkavēt vai mazināt vienlaikus lietoto vielu un zāļu uzsūkšanos. Tādēļ konsultējieties ar ārstu, pirms sākat lietot tādu preparātu kā Ranigast S-O-S, īpaši tad, ja lietojat [pretapauglošanās tabletes](#).

Ranigast S-O-S lietošanai vienlaikus ar tādām zālēm kā omeprazols, cimetidīns vai cisapriāds, kontraindikāciju nav; taču šajos gadījumos ieteicams konsultēties ar ārstu.

## 6. Uzglabāšana

Uzglabāt Ranigast S-O-S sausā vietā un sargājot no tiešas siltuma vai gaismas iedarbības.

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt ierīci līdz 25°C temperatūrā.

## 7. Būdinājumi un piesardzība lietošanā

Šī medicīniskā ierīce pamatā ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Taču Ranigast S-O-S dažkārt var lietot bērniem no 6 gadu vecuma vai pusaudžiem, norādot, ka 6-12 gadus veciem bērniem deva ir jāsamazina uz pusi un preparāts jālieto atbilstoši ieteikumiem. Šābu gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

**Grūtniecības vai krūts barošanas laikā preparātu ieteicams lietot tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.**

Nepārsniedz ieteikto devu, jo lielāka deva var izraisīt aizcietējumu vai īslaicīgu caureju. Preparāts ir kontraindicēts hroniska aizcietējuma vai caurejas, nieru slimības vai hroniskas sirds mazspējas gadījumā.

Nelietojiet Ranigast S-O-S ilgāk par 30 dienām. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

Ja pēc noteikta preparāta lietošanas laika simptomi nav nepārprotami mazinājušies, ieteicams konsultēties ar ārstu. Katra tablete ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Tablete no blistera jāizņem tieši pirms lietošanas.

Nelietojiet tableti tad, ja nepanesat preparāta sastāvdaļas vai Jums ir diagnosticēta paaugstināta jutība pret tām.

## 8. Derīguma termiņš

Nelietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš attiecas uz pareizi uzglabātu un nebojātu medicīniskās ierīces iepakojumu.

## 9. Iznicināšana

Ar ierīci, kurai beidzies derīguma termiņš, jārikojas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Nekādā gadījumā neizmēti preparātu vai tā iepakojumu apkārtējā vidē.

**SIT srl**  
Via Aristo 50/60  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Itālija



## Izplatītājs:

Polpharma SA  
Ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański  
Polija

Pēdējo reizi pārskatīts 04.2020.

ULI-005915\_2

Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>ULT-005915_2</b>		
Preparat/ Product:	<b>RANIGAST S-O-S</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 160 x 140 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/ Text: -		
Gramatura/ Weight:	-	Farmakod/ Pharmacode:	-
Kolorystyka/ Colours:	 <b>P 280 C</b>	Opracował/ Prepared by:	21.05.2021 W.Terlicka