

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
130 mm x 280 mm

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-007108_4		
Preparat/ Product:	Starazolin Suche i Podrażnione Oczy 10 ml_eye drops, solution (LT/LV)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 150 x 300 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Myriad Pro 8 pt		
Kolorystyka/ Colours:	■ BLACK	Opracował/ Prepared by:	13.01.2023 M.Małodzińska



Starazolin® Sausoms ir Sudirgusioms Akims

akių lašai

Drėkinančio, raminančio ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją.

SUDĖTIS

Natrio chloridas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, bevandenis dinatrio fosfatas, natrio hialuronatas 0,15 %, dekspantenolis 2 %, išgrynintas vanduo.

Be konservantų.

TERAPINĖS INDIKACIJOS

Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims stabilizuoja ašarų plėvelę, drėkina akį ir atkuria jos paviršių.

Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims palengvina simptomus ir šiais atvejais:

- esant mechaniniam dirginimui (pvz., deginimas, niežėjimas, ašarojimas) dėl išorinių veiksnių, pvz., vėjo, saulės, chloruoto vandens, vaistų terapijos;
- esant mechaniniam akies paviršiaus sudirginimui (pvz., deginimas, niežėjimas, ašarojimas) dėl, pvz., kontaktinių lęšių nešiojimo, diagnostinių ar chirurginių akių intervencijų;
- esant akių nuovargiui, sukeltam, pvz., ilgo darbo kompiuteriu metu.

Lašų vartojimas greitai palengvina minėtus simptomus.

Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims turi dvejopą poveikį: sudėtyje yra natrio hialuronato, kuris drėkina ir stabilizuoja ašarų plėvelę, ir dekspantenolio, kuris ramina, saugo ir padeda regeneruoti akies paviršių. Pašalinus sausų akių problemas, galima išvengti tolimesnių komplikacijų. Dažniausi sausų akių sindromo simptomai: sausumo pojūtis, smėlio pojūtis akyse ir dirginimas.

Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims veiksmingai pašalina sausų akių sindromo simptomus, kuriuos sukelia:

- ašarų plėvelės pažeida, atsiradusi dėl ašarų trūkumo arba per didelio jų išgaravimo, dėl kurio gali būti pažeistas akies paviršius ir gali atsirasti diskomfortas;
- aplinkos poveikis (centrinis šildymas, oro kondicionavimas, neoninės šviesos, dūmai ir vėjas);
- ilgalaikis darbas kompiuteriu;
- kontaktinių lęšių nešiojimas;
- nuovargį mažinančių akių lašų vartojimas;
- senėjimo procesas (75 % vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių kenčia nuo sausų akių sindromo);
- lytis (hormoniniai pokyčiai moterims nėštumo, žindymo, menstruacijų ar menopauzės metu);
- vaistai (depresijai, hipertenzijai gydyti, kontraceptikai);
- chirurginė intervencija, akies sužalojimai arba svetimkūnio buvimas akyje;
- liga (reumatoidinis artritas, diabetas, astma, skydliaukės sutrikimai, glaukoma).

Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims galima lašinti ant kontaktinių lęšių.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims vartoti negalima:

- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergijai) natrio hialuronatui, dekspantenoliui ar bet kuriai kitai preparato medžiagai. Alerginės reakcijos atveju nedelsdami nutraukite preparato vartojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Kiti įspėjimai:

- Jeigu pastebėjote, kad Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims buteliukas arba aplikatorius yra pažeisti, preparato nevertokite.
- Siekiant užtikrinti saugų vartojimą ir higieną, kiekvieną buteliuką turi naudoti tik vienas asmuo.
- Nėra žinomos Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims sąveikos su kontaktinių lęšių tirpalais, kitais akių lašais ar vietinio poveikio akių tepalais. Jei vartojate kitą akių preparatą, tarp vartojimų palaukite bent 15 minučių.

Atsargumas:

Iš karto po lašų įlašavimo Jūsų regėjimas gali susilpnėti. Todėl rekomenduojama per šį trumpą laiką susilaikyti nuo automobilio vairavimo, transporto priemonės ar mechanizmų valdymo bei palaukti, kol regėjimas vėl atsistatys.

PREPARATO SAUGUMAS

Lašintuvas turi specialiai sukonstruotą filtrą, todėl gaminį saugu naudoti, nes filtras apsaugo nuo skysčio užteršimo net atidarius lašintuvą.

Preparato sudėtyje nėra konservantų, kurie papildomai sumažina akies paviršiaus sudirginimo ir pažeidimo tikimybę.


Preparatas paprastai yra gerai toleruojamas. Vis dėlto, jeigu pastebėjote bet kokį šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Lašai gali būti vartojami kelis kartus per dieną, jei to reikia.

Įlašinkite 1-2 lašus į akį, kelis kartus sumirksėkite, kad tirpalas tolygiai pasiskirstytų akies paviršiuje. Preparate nėra konservantų, todėl jį saugu vartoti į akis.

LAŠUS GALIMA VARTOTI DVIEM BŪDAIS



1. Nuimkite kamštelį nuo pompos.
2. Ranka suimkite pompą, kaip parodyta 2 pav.
3. Apverskite buteliuką dugnu į viršų ir spauskite pompą, kol pasirodys pirmasis lašas.
4. Buteliuką laikydami apverstą ir spausdami pompą, įlašinkite į akį nurodytą lašų skaičių.

GAMINTOJAS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatija

PLATINTOJAS



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Lenkija

TINKAMUMO LAIKAS

Atspausdinta ant pakuotės.

Galiojimo laikas po atidarymo yra 180 dienų.

Nevertokite preparato pasibaigus jo galiojimo laikui.

LAIKYMAS

Preparatą laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, originalioje pakuotėje.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

PAKUOTĖ

10 ml

CE 1304

ATNAUJINIMO DATA

2019 balandis.

Raktažodžiai simboliams ant preparato



Perskaitykite vartojimo instrukciją



Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje



Gamintojas



Serijos Nr.



Galiojimo laikas/Galiojimo pabaigos data



CE ženklas



Sterilus, aseptinis gamybos būdas



Įspėjimas, peržiūrėkite vartojimo instrukciją (dėl svarbių įspėjimų / atsargumo priemonių)





Starazolin® Sausām un Kairinātām Acīm

acu pilieni

Acu pilieni ar mitrinošu, simptomus mazinošu un aizsargājošu iedarbību, kas sekmē acs virsmas atjaunošanos.

SASTĀVS

Nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnofosfāta dihidrāts, bezūdens dinātrija fosfāts, 0,15 % nātrija hialuronāts, 2 % dekspentenols, attīrīts ūdens

Nesatur konservantus.

TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS

Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm acu pilieni paredzēti simptomu mazināšanai viegla vai vidēji smaga sausās acs sindroma un/vai acs virsmas kairinājuma gadījumā. Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm stabilizē asaru plēvīti, mitrina aci un atjauno tās virsmu.

Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm mazina sūdzības arī šādos gadījumos:

- vides faktoru, piemēram, vēja, saules, hlorēta ūdens, zāļu terapijas, izraisīts mehāniskais kairinājums (piemēram, dedzināšana, nieze, asarošana);
- dažādu faktoru, piemēram, kontaktlēcu vai ar acīm saistītu diagnostisku vai ķirurģisku procedūru, izraisīts acs virsmas mehāniskais kairinājums (piemēram, dedzināšana, nieze, asarošana);
- acu nogurums, ko izraisa, piemēram, ilgstošs darbs pie datora.

Pilienu lietošana ātri mazina iepriekš minētos simptomus.

Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm ir divkārtša iedarbība - tie satur nātrija hialuronātu, kas hidratē un stabilizē asaru plēvīti, un dekspentenolu, kas mazina simptomus, aizsargā acs virsmu un sekmē tās atjaunošanos. Ar acu sausumu saistīto traucējumu mazināšana var novērst sarežģījumu rašanos. Biežākās sausās acs sindroma pazīmes ir sausuma sajūta, graušana un kairinājums.

Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm efektīvi panāk sausās acs sindroma pazīmju izzusušanu, ja to ir izraisījuši:

- ar samazinātu asaru veidošanos vai pārmērīgu iztvaikošanu saistīti asaru plēves veidošanās traucējumi, kuru dēļ var rasties acs virsmas bojājums un diskomforts;
- vides faktori (centrālāpkure, gaisa kondicionēšana, neona gaismas, dūmi un vējš);
- ilgstošs darbs pie dators;
- kontaktlēcu nēsāšana;
- tūsku mazinoši acu pilieni (dekongestanti);
- novecošana (pēc 65 gadu vecuma acs sausuma sindroms ir 75 % iedzīvotāju);
- dzimumhormonu līmeņa pārmāņas (grūtniecības, zīdīšanas, menstruāciju vai menopauzes laikā);
- zāles (depresijas un hipertensijas ārstēšanai, kontraceptīvie līdzekļi);
- ķirurģiska procedūra, acs bojājums vai svešķermenis acī;
- slimība (reimatoīdais artrīts, cukura diabēts, astma, vairogdziedzera darbības traucējumi, glaukoma).

Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm var lietot uz kontaktlēcām.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ

Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm nedrīkst lietot šādos gadījumos:

- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret nātrija hialuronātu, dekspentenolu vai kādu citu šī līdzekļa sastāvdaļu.
- Alerģiskas reakcijas gadījumā nekavējoties pārtrauciet šī līdzekļa lietošanu un sazinieties ar ārstu.

Citas piezīmes

- Nelietojiet šos līdzekli, ja ievērojāt, ka Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm pudelīte vai aplikators ir bojāts.
- Lai acu pilienu lietošana būtu droša un atbilstu higiēnas prasībām, katru pudelīti drīkst lietot tikai viens cilvēks.
- Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm nav zināmu mijiedarbību ar kontaktlēcu šķīdumiem, citiem acu pilieniem vai vietējās darbības acu ziedēm. Starp Starazolin Sausām un Kairinātām Acīm pilienu un cita acu līdzekļa lietošanu ievērojiet vismaz 15 minūšu starplaiku.

Brīdinājumi:

Uzreiz pēc pilienu lietošanas Jūsu redze var pasliktināties. Tādēļ šajā īsajā laika posmā ir ieteicams atturēties no transportlīdzekļa vadīšanas un iekārtu apkalpošanas līdz brīdim, kad Jūsu redze atkal ir skaidra.

PRODUKTA DROŠUMS

Pilinātājā ir īpašs filtrs, kura dēļ šo līdzekli **var droši lietot**, jo filtrs novērš piesārņojuma nonākšanu šķīdumā pat pēc pudelītes atskrūvēšanas.

Šis līdzeklis nesatur konservantus, un tas papildus samazina acs virsmas kairinājuma un bojājuma iespēju.


Cilvēki šo līdzekli kopumā panes labi. Taču blakusparādību rašanās gadījumā konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Šos pilienus pēc vajadzības var lietot vairākas reizes dienā.

Iepilniet 1-2 pilienus acī, vairākas reizes pamirkšķiniet aci, lai šķīdums vienmērīgi izplūstu pa visu acs virsmu. Šis līdzeklis nesatur konservantus, tādēļ to var droši lietot aci.

PILIENU LIETOŠANAI IR DIVAS METODEDES



VAI

1. Noņemiet aizbāzni no sūkņa.
2. Satveriet sūkni rokā, kā redzams 2. attēlā.
3. Pagrieziet pudelīti otrādi un spiediet sūkni, līdz redzams pirmais pilienis.
4. Turiet pudelīti otrādi un, spiežot sūkni, iepilniet aci nepieciešamo pilienu skaitu.

RAŽOTĀJS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Horvātija

IZPLATĪTĀJS



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polija

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Norādīts uz iepakojuma.

Derīgs 180 dienas pēc pudelītes atvēršanas.

Nelietojiet šo līdzekli pēc derīguma termiņa beigām.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt šo līdzekli oriģinālā iepakojumā temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

IEPAKOJUMS

10 ml



ATJAUNOŠANAS DATUMS

2019. gada aprīlis.

Uz līdzekļa norādīto simbolu nozīme



Izlasiet lietošanas instrukciju



Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.



Ražotājs



Sērija:



Uzglabāšanas ilgums/Derīguma termiņš



CE marķējums



Sterila, aseptiska ražošanas metode



Brīdinājums, skatīt lietošanas instrukciju (informāciju par svarīgiem brīdinājumiem/piesardzību)