


POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX

130 mm x 280 mm

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-007380_3		
Preparat/ Product:	Starazolin HydroForte 10 ml (LT + LV)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 150 x 300 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Myriad Pro 8 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 BLACK	Opracował/ Prepared by:	19.12.2022 N. Kowalke-Lepek



Starazolin® HydroForte

akių lašai

Intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui.

SUDĖTIS

Natrio chloridas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, bevandenis dinatrio fosfatas, natrio hialuronatas 0,4%, išgrynintas vanduo.

BE KONSERVANTŲ

TERAPINĖS INDIKACIJOS

Starazolin HydroForte skirtas **sunkios formos** sausų akių sindromo simptomams palengvinti.

Starazolin HydroForte drėkina, apsaugo ir mažina akių sudirginimą. Vartojant lašus greitai sumažėja diskomfortas esant sausų akių sindromui, pvz., sausumo pojūtis, smėlio po vokais pojūtis ir dirginimas.

Palengvinus sausų akių sindromo simptomus galima išvengti komplikacijų.

Starazolin HydroForte veiksmingai pašalina sausų akių sindromo simptomus, kuriuos sukelia:

- ašarų plėvelės pažeidimas, atsiradusi dėl ašarų trūkumo arba per didelio jų išgaravimo, dėl kurio gali būti pažeistas akies paviršius ir gali atsirasti diskomfortas;
- nepalankios aplinkos sąlygos (centrinis šiltdymas, oro kondicionavimas, neoninės šviesos, dūmai ir vėjas);
- ilgalaikis darbas kompiuteriu;
- nuovargį mažinančių akių lašų vartojimas;
- senėjimo procesas (75 % vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių kenčia nuo sausų akių sindromo);
- kontaktinių lęšių nešiojimas;
- chirurginis gydymas arba akies sužalojimai;
- lytis (hormoniniai pokyčiai moterims nėštumo, žindymo, menstruacijų ar menopauzės metu);
- vaistų vartojimas (antidepresantų, vaistų hipertenzijai gydyti, kontraceptikų);
- ligos (reumatoidinis artritas, diabetas, astma, skydliaukės sutrikimai, glaukoma).

Starazolin HydroForte yra didesnio klampumo akių lašai, todėl natrio hialuronatas ilgiau išsilaiko akių paviršiuje. Tai užtikrina ilgesnį drėkinimą ir geresnę akių apsaugą.

Natrio hialuronatas natūraliai randamas akies vandeniniame skystyje ir stiklakūnyje.

Starazolin HydroForte sudėtyje esantis 0,4 % natrio hialuronatas suformuoja apsauginę plėvelę ant akies obuolio paviršiaus. Taip preparatas pašalina sausų akių sindromo simptomus, tokius kaip: sausumo pojūtis, smėlio po vokais pojūtis ir dirginimas.

Starazolin HydroForte akių lašai taip pat rekomenduojami po chirurginių procedūrų ir esant sausoms akims, atsiradusioms vartojant ant akių priešuždegiminius vaistinius preparatus (pasitarus su gydytoju).

Prieš lašindami Starazolin HydroForte akių lašus, išsiimkite kontaktinius lęšius ir praėjus 15 minučių po sulašinoimo vėl galima juos įsidėti.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Starazolin HydroForte vartoti negalima:

- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) natrio hialuronatui ar bet kuriai kitai preparato medžiagai.
- Alerginės reakcijos atveju nedelsdami nutraukite preparato vartojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Kiti įspėjimai:

- Jeigu pastebėjote, kad buteliukas arba aplikatorius yra pažeisti, preparato nevertokite.
- Siekiant užtikrinti saugų vartojimą ir higieną, kiekvieną buteliuką turi naudoti tik vienas asmuo.
- Nėra žinomos Starazolin HydroForte sąveikos su kontaktinių lęšių tirpalais, kitais akių lašais ar vietinio poveikio akių tepalais. Jei vartojate kitą akių preparatą, tarp vartojimų palaukite bent 15 minučių.

Pastaba:

Starazolin HydroForte gali labai trumpam sukelti neryškų matymą. Todėl rekomenduojama per šį laiką susilaikyti nuo automobilio vairavimo, transporto priemonės ar mechanizmų valdymo bei palaukti, kol regėjimas vėl atsistatys.

PREPARATO SAUGUMAS

Lašintuvus turi specialiai sukonstruotą filtrą, todėl preparatą **saugu naudoti**, nes filtras apsaugo nuo skysčio užteršimo net atidarius lašintuvą.


Preparato sudėtyje nėra konservantų, tai papildomai sumažina akies paviršiaus sudirginimo ir pažeidimo atsiradimo tikimybę. Preparatas paprastai yra gerai toleruojamas. Vis dėlto, jeigu pastebėjote bet kokį šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Lašai gali būti vartojami kelis kartus per dieną, jei to reikia. Tinkamai vartojant, vieno buteliuko užtenka 30 dienų vartojimui. Dėl ilgalaikio vartojimo kreipkitės į gydytoją.

Įlašinkite 1-2 lašus į akį, kelis kartus sumirksėkite, kad tirpalas tolygiai pasiskirstytų akies paviršiuje. Preparatė nėra konservantų, todėl jį saugu vartoti į akis.

LAŠUS GALIMA VARTOTI DVIEM BŪDAIS



1. Nuimkite kamštelį nuo pompos.
2. Ranka suimkite pompą, kaip parodyta 2 pav.
3. Apverskite buteliuką dugnu į viršų ir spauskite pompą, kol pasirodys pirmasis lašas.
4. Buteliuką laikydami apverstą ir spausdami pompą, įlašinkite į akį nurodytą lašų skaičių.

GAMINTOJAS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatija

PLATINTOJAS



Polpharma SA Pharmaceutical Works
ul. Pelpliška 19
83-200 Starogard Gdański, Lenkija

TINKAMUMO LAIKAS

Atspausdinta ant pakuotės.
Tinkamumo laikas po atidarymo yra 180 dienų.
Nevartokite preparato pasibaigus jo tinkamumo laikui.

LAIKYMAS

Preparatą laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

PAKUOTĖ

10 ml



PERŽIŪROS DATA

2019 m. balandžio mėn.

Raktažodžiai simboliams ant preparato



Perskaitykite vartojimo instrukciją



Gamintojas



Serijos nr.



Tinkamumo laikas



CE ženklas



Sterilus, aseptinis gamybos būdas



Viršutinė temperatūros riba



Įspėjimas, peržiūrėkite vartojimo instrukciją (dėl svarbių įspėjimų/atsargumo priemonių)



Starazolin® HydroForte

acu pilieni

Intensīvi mitrinoši acu pilieni, kas izstrādāti lietošanai smaga sausās acs sindroma gadījumā.

SASTĀVS

Nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, bezūdens dinātrija fosfāts, 0,4 % nātrija hialuronāts, attīrīts ūdens

BEZ KONSERVANTIEM

TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS

Starazolin HydroForte paredzēts **smagas** sauso acu sindroma formas atvieglošanai.

Starazolin HydroForte mitrina, aizsargā un mazina graušanas sajūtu. Pilienu lietošana ātri atvieglo sausās acs sindroma radīto diskomfortu, piemēram, sausuma sajūtu, smilšu graudiņu klātbūtnes sajūtu zem plakstiņiem un kairinājumu.

Sausās acs sindroma simptomu atvieglošana var mazināt komplikāciju risku.

Starazolin HydroForte efektīvi novērš simptomus, ko izraisa

- asaru deficīta vai pārmērīgas asaru iztvaikošanas izraisīta asaru plēvītes anomālija, kuras dēļ iespējami acs virsmas bojājumi un ar tiem saistītais diskomforts;
- nevēlami vides apstākļi (centrālāpkure, gaisa kondicionēšana, fluorescences spuldžu izmantošana, smēķēšana un vējš);
- ilgš darbs pie datora;
- acu pilienu ar asinsvadus sašaurinošu darbību lietošana;
- novecošana (sausas acs sindroms ir 75 % cilvēku pēc 65 gadu vecuma);
- kontaktlēcu valkāšana;
- ķirurģiska ārstēšana vai acu traumas;
- dzimums (hormonālās pārmaiņas sievietes grūtniecības laikā, barošana ar krūti, mēnešreizes vai menopauze);
- zāļu (antidepresantu, prethipertensijas līdzekļu vai kontracepcijas līdzekļu) lietošana;
- slimības (reimatoīdais artrīts, diabēts, astma, vairogdziedzera slimības, glaukoma).

Starazolin HydroForte ir acu pilieni ar palielinātu viskozitāti, tādēļ nātrija hialuronāts ilgāk paliek uz acs virsmas. Tas acīm nodrošina ilgāku mitrināšanu un labāku aizsardzību.

Nātrija hialuronāts dabiski rodas acs ābola kameru šķidrumā un stiklveida ķermenī.

0,4 % nātrija hialuronāta, ko satur Starazolin HydroForte, uz acs ābola izveido aizsargplēvīti, un tā novērš sausās acs sindroma simptomus, piemēram, sausuma sajūtu, smilšu graudiņu klātbūtnes sajūtu zem plakstiņiem un kairinājumu.

Starazolin HydroForte acu pilienu lietošana ir ieteicama arī pēc ķirurģiskas ārstēšanas un pret acu sausumu, ko izraisījis pretiekaisuma zāļu lietošana acīs (pēc konsultēšanās ar ārstu).

Pirms Starazolin HydroForte acu pilienu lietošanas jāizmēģina kontaktlēcas, un pirms to ielikšanas atpakaļ acīs jāpaiet 15 minūtēm.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

Nelietot Starazolin HydroForte, ja

- ir paaugstināta jutība (alerģija) pret nātrija hialuronātu vai kādu citu šo pilienu sastāvdaļu.
- Ja ir radusies alerģiska reakcija, nekavējoties jāpārtrauc pilienu lietošana un jākonsultējas ar ārstu.

Citas piebildes

- Nelietojiet pilienus, ja pamanāt, ka ir bojāta pudelīte vai aplikators.
- Lietošanas drošuma un higiēnas apsvērumu dēļ katru pudelīti ir atļauts lietot tikai vienai personai.
- Par Starazolin HydroForte acu pilienu mijiedarbību ar kontaktlēcu uzglabāšanas šķīdumiem, citiem acu pilieniem vai lokāli lietojamām acu zālēm nav ziņāms. Ja lietojat arī citas acu zāles, pirms dažādu līdzekļu lietošanas jānogaida vismaz 15 minūtes.

Piezīme

Starazolin HydroForte uz mirkli var izraisīt redzes miglošanos, tādēļ šai laikā ir ieteicams atturēties no transportlīdzekļa vadīšanas vai darba ar iekārtām un nogaidīt, līdz ir atjaunojusies asa redze.

ZĀĻU DROŠUMS

Pilinātājā ir īpašas konstrukcijas filtrs, kas ļauj **droši lietot** pilienus, jo nepieļauj to piesārņošanu pat pēc iepakojuma atvēršanas.

Šie pilieni nesatur konservantus, tādēļ vēl vairāk samazinās acu kairinājuma un to virsmas bojājumu iespējamība.

Kopumā pilieni ir labi panesami, tomēr tad, ja novērojat jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.


NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Pilienus pēc nepieciešamības var lietot vairākas reizes dienā. Ja pilieni tiek lietoti pareizi, ar vienas pudelītes saturu pietiek 30 dienām.

Par ilgstošu lietošanu jākonsultējas ar ārstu.

Acī iepilināt 1–2 pilienus un vairākas reizes samirkšķināt aci, lai šķidrums vienmērīgi izkliedētos pa acs virsmu. Pilieni nesatur konservantus, tādēļ to lietošana acīs ir droša.

ŠIE PILIENI IR LIETOJAMI DIVOS VEIDOS



1. Izņemiet no sūkņa aizbāzni.
2. Satveriet sūkni rokās, ka parādīts 2. attēlā.
3. Apgrīziet pudelīti otrādi un spiediet sūkni, līdz parādās pirmais pilienis.
4. Turot pudelīti ar augšdaļu uz leju un spiežot sūkni, iepiliniet aci parakstīto pilienu daudzumu.

RAŽOTĀJS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilo 20, 51000 Rijeka, Horvātija

IZPLATĪTĀJS



Polpharma SA Pharmaceutical Works
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polija

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Uzdrukāts uz iepakojuma.

Pēc iepakojuma atvēršanas pilienu derīguma termiņš ir 180 dienas. Nelietot pilienus, kad pagājis to derīguma termiņš.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt pilienus oriģinālajā iepakojumā līdz 30 °C temperatūrā.

Uzglabāt šos pilienus bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

IEPAKOJUMS

10 ml



PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019. gada aprīlis

Uz iepakojuma izmantoto simbolu paskaidrojums



Izlasīt lietošanas instrukciju



Ražotājs



Sērijas numurs



Derīguma datums



CE marķējums



Sterils, ražots aseptiski



Maksimālā temperatūra



Uzmanību! Skatīt lietošanas instrukciju – tajā ir aprakstīti būtiski brīdinājumi un piesardzība.