

Pacienta brīdinājuma kartīte

Polbaxan 2,5 mg (ielieciet atzīmi blakus nozīmētajai devai)

Polbaxan 10 mg (ielieciet atzīmi blakus nozīmētajai devai)

Polbaxan 15 mg (ielieciet atzīmi blakus nozīmētajai devai)

Polbaxan 20 mg (ielieciet atzīmi blakus nozīmētajai devai)

♦ **Vienmēr nēsājiet šo kartīti līdz.**

♦ **Uzrādiet šo kartīti katram ārstam vai stomatologam pirms ārstēšanas.**

Es lietoju antikoagulantu Polbaxan (rivaroksabānu)

Vārds, uzvārds:

Adrese:

Dzimšanas datums:

Ķermeņa masa:

Citas zāles / slimības:

Neatliekamā situācijā, lūdzu, informējiet:

Ārsta vārds, uzvārds:

Ārsta tālruņa numurs:

Ārsta zīmogs:

Lūdzu, informējiet arī

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

Saistība:

Informācija veselības aprūpes speciālistiem

♦ INR vērtības nedrīkst izmantot, jo tās nav atbilstoši Polbaxan antikoagulanta aktivitātes rādītāji.

Ko man vajadzētu zināt par Polbaxan?

♦ Polbaxan šķīdina asinis, novēršot bīstamu asins recekļu veidošanos.

♦ Polbaxan jālieto tieši tā, kā ārsts Jums nozīmējis. Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību pret asins recekļiem, **nekad neizlaidiet devu.**

♦ Jūs nedrīkstat pārtraukt Polbaxan lietošanu, ja vispirms neesat konsultējies ar ārstu, jo Jums var paaugstināties asins recekļu veidošanās risks.

♦ Pirms Polbaxan lietošanas uzsākšanas pastāstiet savam veselības aprūpes speciālistam par visām citām zālēm, kuras pašlaik lietojat, esat lietojis nesen vai plānojat sākt lietot.

♦ Pirms jebkādas operācijas vai invazīvas procedūras pastāstiet savam veselības aprūpes speciālistam, ka Jūs lietojat Polbaxan.

Kad man ir jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu?

Lietojot asinis šķīdriņošu līdzekli, piemēram, Polbaxan, ir svarīgi zināt, kādas ir iespējamās blakusparādības.

Visbiežākā blakusparādība ir asiņošana. Nesāciet lietot Polbaxan, ja zināt, ka Jums ir asiņošanas risks, ja vispirms to neesat pārrunājis ar savu ārstu. Nekavējoties informējiet savu veselības aprūpes speciālistu, ja Jums ir kādas asiņošanas pazīmes vai simptomi, piemēram,

♦ sāpes;

♦ pietūkums vai nepatīkama sajūta;

♦ galvassāpes, reibonis vai vājums;

♦ neparasti asinsizplūdumi, deguna asiņošana, smaganu asiņošana, ilgstoša asiņošana no grieztām brūcēm;

♦ stiprāka nekā parasti menstruālā asiņošana vai asiņošana no maksts;

- ♦ asinis urīnā sārtā vai brūnā krāsā, sarkani vai melni izkārnījumi;
- ♦ asiņu atkrēpošana, asiņu vemšana vai kafijas biežumiem līdzīgas atvēmtās masas.

Kā jālieto Polbaxan?

- ♦ Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību, Polbaxan
 - 2,5 mg var lietot neatkarīgi no uztura;
 - 10 mg var lietot neatkarīgi no uztura;
 - 15 mg jālieto kopā ar uzturu;
 - 20 mg jālieto kopā ar uzturu.

Version 0.1_04.2025_LV_film-coated tablets