

## Písomná informácia pre používateľa

### Entizol 250 mg tablety

*Metronidazol*

#### **Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akákoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

#### **V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Entizol 250 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Entizol 250 mg
3. Ako užívať Entizol 250 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Entizol 250 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Entizol 250 mg a na čo sa používa**

Entizol 250 mg má antiprotozoálne (pôsobí proti prvkom) a antibakteriálne (pôsobí proti baktériám) účinky.

Entizol 250 mg sa používa u dospelých a detí na predchádzanie infekcie a na liečbu infekcií spôsobených určitými druhmi mikroorganizmov nasledovným spôsobom:

- predchádzanie infekciám objavujúcim sa po operáciách
- liečba bakteriálnych infekcií ako sú infekcie krví, mozgu, kostí, plúc, brušnej výstrelky (pobrušnice) a panvovej oblasti, ako aj popôrodné infekcie alebo infekcie na mieste operačného zákroku
- liečba infekcií močových ciest spôsobených parazitom *Trichomonas vaginalis*, u žien ako aj u mužov
- liečba nešpecifikovaných pohlavných infekcií u žien spôsobených baktériami.
- liečba parazitických ochorení ako amebíaza (postihujúca črevné alebo iné telesné systémy a zahŕňa aj bezpríznakových nosičov (nosičov cýst).
- liečba giardiázy
- liečba infekcií ďasien a zubov
- liečba infikovaných vredov predkolenia a preležanín.

Potrebné je vziať do úvahy oficiálne odporúčania o vhodnom používaní antibakteriálnych liečiv.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Entizol 250 mg**

**Neužívajte Entizol 250 mg:**

- ked' ste alergický na metronidazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), alebo ktorúkoľvek iný derivát 5-nitroimidazolu.

## **Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Entizol 250 mg, obráťte sa na svojho lekára :

- ak máte alebo ste v minulosti prekonali akékoľvek ochorenie pečene
- ak podstupujete dialýzu obličiek.
- ak máte závažné ochorenie nervov alebo mozgu

Počas liečby liekom Entizol 250 mg

**Prestaňte Entizol 250 mg užívať a okamžite vyhľadajte lekára:**

Počas liečby metronidazolom sa môžu vyskytnúť závažné bulózne kožné reakcie, niekedy smrteľné, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4). Ak máte skúenosť s príznakmi podobnými chrípke a vyvynie sa vyrážka (často s pľuzgiermi alebo zmenami na slizničiach), ukončite liečbu a vyhľadajte lekára.

U pacientov so syndrómom Cockayne, ktorí užívali lieky s obsahom metronidazolu, boli hlásené prípady závažnej pečeňovej toxicity/akútneho zlyhania pečene, vrátane prípadov so smrteľnými následkami.

Ak trpíte syndrómom Cockayne, váš lekár musí počas liečby metronidazolom a po nej tiež pravidelne sledovať fungovanie vašej pečene.

Okamžite sa obráťte na svojho lekára a prestaňte Entizol 250 mg užívať, ak sa u vás vyskytne:

- bolest žalúdka, anorexia, nevoľnosť, vracanie, horúčka, malátnosť, únava, žltačka, tmavo sfarbený moč, popolavá alebo nažlto (žltozeleno) sfarbená stolica alebo svrbenie.

Váš lekár môže urobiť niektoré testy, ak ste užívali tento liek dlhšie ako 10 dní.

Metronidazol nemá priamy účinok proti aeróbnym alebo fakultatívne anaeróbnym baktériám.

Aj po vyliečení *Trichomonas vaginalis* môže pretrvávať gonokoková infekcia.

Počas liečby metronidazolom a ešte najmenej 48 hodín po jej skončení nepite alkoholické nápoje kvôli možným nežiaducim reakciám (pozri "Entizol 250 mg a jedlo, nápoje a alkohol").

Ak máte poskytnúť vzorku na laboratórne vyšetrenie, upozornite lekára alebo zdravotnú sestru, že užívate Entizol 250 mg. Výsledky niektorých testov môžu byť skreslené.

Metronidazol môže spôsobiť stmavnutie moču.

## **Iné lieky a Entizol 250 mg**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä pri:

- perorálnych (užívaných ústami) liekoch proti zrážaniu krvi (napr. warfarín),
- lítiu (užívanom na psychické poruchy),
- liekoch na liečbu epilepsie (napr. fenobarbital, fenytoín),
- disulfirame (na liečbu alkoholizmu),
- cyklosporíne (užívanom po transplantácii orgánov),
- fluorouracile alebo busulfane (užívanom na liečbu niektorých foriem rakoviny),

- cimetidíne (užívanom na liečbu žalúdočných vredov) alebo pri iných liekoch na prekyslenie žalúdka, ktoré môžete kúpiť bez lekárskeho predpisu.

### **Entizol 250 mg a jedlo, nápoje a alkohol**

Počas liečby liekom Entizol 250 mg a 48 hodín po skončení užívania tablet nie je vhodné požívať alkoholické nápoje, pretože to môže spôsobiť nepríjemné vedľajšie účinky ako nevoľnosť a vracanie, bolesti brucha, návaly horúčavy, búsenie srdca a bolesti hlavy.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

#### *Tehotenstvo*

Ak ste tehotná, váš lekár vám podá metronidazol len v prípade, ak je to absolútne nevyhnutné.

#### *Dojčenie*

Počas liečby metronidazolom nedojčite a dojčenie začnite až po 2 – 3 dňoch po ukončení liečby, pretože metronidazol prechádza do materského mlieka.

#### *Plodnosť*

Štúdie na zvieratách naznačujú možný negatívny vplyv metronidazolu na mužský rozmnožovací systém pri podávaní vysokých dávok, výrazne prevyšujúcich maximálnu odporúčanú dávku u ľudí

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Metronidazol niekedy môže spôsobať ospalosť, závrat, zmätenosť, halucinácie, kŕče (záchvaty) alebo dočasne ovplyvniť zrak (napr. neostré alebo dvojité videnie). Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky, nevedzte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

### **Entizol 250 mg obsahuje glukózu (škrobový sirup)**

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

### **3. Ako užívať Entizol 250 mg**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Kvôli nedostatočným dôkazom o riziku mutagenity u ľudí používanie metronidazolu dlhšiu dobu, ako je obvykle potrebné, treba starostlivo zvážiť.

Kvôli ľahšiemu podávaniu je môžné det'om tablety rozdrvíť.

Odporúča sa tablety užívať s jedlom alebo po jedle.

Odporučané dávky sú:

#### **Anaeróbne infekcie**

##### ***Deti mladšie ako 8 týždňov***

15 mg/kg ako jednorazová denná dávka alebo rozdelená na 7,5 mg/kg každých 12 hodín.

U novorodencov s gestáciou menej ako 40 týždňov sa počas prvého týždňa života môže objaviť akumulácia metronidazolu, preto koncentrácie metronidazolu v sére je potrebné kontrolovať počas prvých dní liečby.

##### ***Deti staršie ako 8 týždňov a mladšie ako 12 rokov:***

Obvyklá denná dávka je 20-30 mg/kg/deň podávaná ako jednorazová dávka alebo rozdelená na 7,5 mg/kg každých 8 hodín. Denná dávka môže byť zvýšená do 40 mg/kg, v závislosti od závažnosti infekcie. Dĺžka liečby je obvykle 7 dní.

##### ***Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:***

750 mg nasledovaných 375 mg každých 8 hodín. Dĺžka liečby je obvykle 7 dní.

#### **Prevencia anaeróbnych infekcií:**

Predovšetkým v súvislosti s brušnými (najmä kolorektálnymi) a gynekologickými operáciami.

Novorodenci s gestáciou menej ako 40 týždňov:

10 mg/kg telesnej hmotnosti ako jednorazová dávka pred operáciou.

*Deti mladšie ako 12 rokov:*

20-30 mg/kg ako jednorazová dávka podaná 1-2 hodiny pred chirurgickým zákrokom.

*Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:*

500 mg v 8-hodinových intervaloch počas 24 hodín tesne pred operáciou nasledované pooperačným intravenóznym alebo rektálnym podávaním, pokým pacient nie je schopný užiť tablety.

#### **Bakteriálna vaginóza:**

*Dospievajúci (12-17 rokov):*

500 mg dvakrát denne počas 5-7 dní alebo 2000 mg ako jednorazová dávka.

*Dospelí:*

500 mg dvakrát denne počas 7 dní alebo 2000 mg ako jednorazová dávka.

#### **Urogenitálna trichomoniáza:**

*Deti mladšie ako 10 rokov:*

40 mg/kg perorálne ako jednorazová dávka alebo 15-30 mg/kg/deň rozdelených do 2-3 dávok počas 7 dní; celková denná dávka nesmie prekročiť 2000 mg.

*Dospelí a dospievajúci nad 10 rokov:*

2000 mg ako jednorazová dávka alebo 250 mg trikrát denne počas 7 dní alebo 500 mg dvakrát dene počas 5-7 dní.

Kde je pravdepodobnosť šírenia infekcie, u dospelých sa odporúča súbežne liečiť rovnakou dávkou aj partnera/partnerku.

#### **Giardiáza:**

*Deti od 1 do 3 rokov:* 500 mg raz denne počas 3 dní

*Deti od 3 do 7 rokov:* 600 až 800 mg raz denne počas 3 dní

*Deti od 7 do 10 rokov:* 1000 mg raz denne počas 3 dní

*Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:* 2000 mg raz denne počas 3 dní alebo 400 mg trikrát dene počas 5 dní, alebo 500 mg dvakrát denne počas 7 až 10 dní.

Alternatívne, vyjadrené v mg na kg telesnej hmotnosti:

15 - 40 mg/kg/deň rozdelených do 2 až 3 dávok.

#### **Amébiáza:**

*Deti od 1 do 3 rokov:* 100 až 200 mg trikrát denne počas 5-10 dní

*Deti od 3 do 7 rokov:* 100 až 200 mg štyrikrát denne počas 5-10 dní

*Deti od 7 do 10 rokov:* 200 až 400 mg trikrát denne počas 5-10 dní

*Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:* 400 až 800 mg trikrát denne počas 5-10 dní

Alternatívne, dávka vyjadrená v mg na kg telesnej hmotnosti:

35 až 50 mg/kg/deň rozdelených do 3 dávok počas 5 až 10 dní, celková dávka nesmie prekročiť 2400 mg/deň.

#### **Eradikácia Helicobacter pylori u detí:**

Ako súčasť kombinovanej liečby, 20 mg/kg/deň, dávka nesmie prekročiť 500 mg dvakrát denne počas 7-14 dní. Pred začiatkom liečby treba prekonzultovať oficiálne postupy a odporúčania.

#### **Akútnej ulceratívnej gingivítide:**

*Deti do 10 rokov:* 35 až 50 mg/kg trikrát denne v 3 oddelených dávkach počas 3 dní

*Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:* 250 mg dvakrát denne počas 3 dní

**Akútne dentálne infekcie:**

*Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:* 250 mg dvakrát denne počas 3 -7dní

**Vredy predkolenia a dekubity:**

*Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:* 500 mg dvakrát denne počas 7dní

**Starší pacienti:**

Starší pacienti dobre znášajú metronidazol, avšak jedna farmakokinetická štúdia odporúča opatrnosť pri užívaní vysokých dávok u tejto vekovej skupiny.

**Ak zabudnete užiť Entizol 250 mg**

Čo najskôr užite vynechanú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

**Ak užijete viac Entizolu 250 mg, ako máte**

V prípade predávkovania okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

#### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia, druh a závažnosť vedľajších účinkov sú u detí podobné ako u dospelých.

**Ak sa u vás objaví niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte Entizol 250 mg užívať a ihned vyhľadajte lekára:**

**Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)**

reakcia z precitlivenosti (anafylaxia) príznaky sú : svrbenie, vyrážka, opuch na koži, nádcha, chrapot, sťažené dýchanie, pocit tepla, pokles krvného tlaku, závrat, zrýchlený tep

**Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)**

agranulocytóza (žiadne granulocyty - biele krvinky v krvi), neutropénia (nedostatok určitého typu bielych krviniek), trombocytopenia (nízky počet krvných doštičiek), pancytopenia (nedostatok červených , bielych krviniek a krvných doštičiek). Prvé príznaky agranulocytózy sú horúčka, bolest' hrdla, povrchové vriedky na sliznici v ústach, príznaky podobné chrípke, únava, krvácanie (napr. modriny, petechie, purpura, krvácanie z nosa).

Zaznamenali sa prípady zlyhania pečene vyžadujúce transplantáciu pečene u pacientov liečených metronidazolom v kombinácii s inými antibiotikami. Príznaky poškodenia pečene môžu byť životohrozujúce a zahŕňajú: bolest' žalúdka, nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, horúčka, malátnosť, únava, žltáčka, tmavo sfarbený moč, popolavá alebo nažlto (žltozeleno) sfarbená stolica alebo svrbenie.

**Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)**

angioedém (opuch tváre, jazyka a priedušnice, čo spôsobuje ťažkosti s dýchaním), žihľavka, horúčka, závažné kožné alergické reakcie ako sú erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza,

(tvorba pluzgierov až po erózie na ústnej sliznici, spojovkách, genitáliah), toxická epidermálna nekrolýza (erytematózno-bulózne zmeny na koži a slizniaciach, ktoré vedú k odlupovaniu veľkých častí pokožky a odhaleniu veľkej plochy nižších vrstiev kože).

**Ak sa u vás objaví niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov, ihneď vyhľadajte lekára:**

**Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)**

encefalopatia (napr. zmätenosť, bolesť hlavy, halucinácie, paralýza, citlivosť na svetlo, poruchy zraku a pohybu, stuhnutosť šíje) a subakútne cerebelárny syndróm (napr. porucha koordinácie pohybov, porucha výslovnosti, porucha chôdze, nystagmus (kmitavé pohyby očí) a tras), čo môžu byť dôvody na ukončenie liečby;

psychické poruchy – stavy zmätenosti a halucinácie.

**Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):**

Počas intenzívnej a/alebo dlhšie trvajúcej liečby metronidazolom sa môže vyskytnúť periférna senzorická neuropatia (príznaky môžu zahŕňať pálenie, pichanie, mravčenie končatín) alebo prechodné záchvaty podobné epileptickým; lekár vám možno upraví dávku.

**Ostatné vedľajšie účinky môžu zahŕať:**

**Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)**

- psychotické problémy, vrátane zmätenosti a halucinácií;
- ospalosť, závraty, kŕče, bolesť hlavy;
- poruchy videnia ako je dvojité videnie a myopia, vo väčšine prípadov prechodné;
- zvýšené pečeňové enzýmy (AST, ALT, alkalická fosfatáza), zápal pečene (hepatitída) a poškodenie buniek pečene, žltačka a pankreatitída, ktoré vymiznú po vysadení lieku;
- kožné vyrážky, pustulárna vyrážka, svrbenie, začervenanie;
- bolesti svalov a kĺbov;
- stmavnutie moču v dôsledku vo vode rozpustných farbív, ktoré pochádzajú z premeny metronidazolu.

**Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):**

- leukopénia (nízky počet bielych krviniek);
- anorexia
- pocit depresie;
- aseptická meningitída;
- optická neuropatia/neuritída (príznaky zahŕňajú napríklad bolesť očí, problémy s videním);
- poruchy chuti, zápal ústnej sliznice, povlak na jazyku, nauzea, vracanie, gastrointestinálne problémy ako bolesť brucha a hnačka
- erythema multiforme,
- vaginálna bolesť a kvasinková infekcia.

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

Kvetná 11

SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

internetová stránka: <http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov>

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Entizol 250 mg**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25°C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto oparenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Entizol 250 mg obsahuje**

- Liečivo je 250 mg metronidazol.
- Ďalšie zložky sú zemiakový škrob, želatína, škrobový sirup, stearan horečnatý.

### **Ako vyzerá Entizol 250 mg a obsah balenia**

Tablety sú biele so žltkastým odtieňom, po vystavení slnečnému svetlu zožltnú, ploché, s deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

1 balenie obsahuje 20 tablet.

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:**

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19 Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański, Poľsko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2017**