


KIERUNEK WŁÓKNA/ FIBRE DIRECTION



Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	UVID-2173-800_2		
Preparat/ Product:	OlIDETRIM vitamin D3 25 µg (1000 IU)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 210 x 145 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: ----- Tekst/ Text: -----		
Gramatura/ Weight:	50 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	161
Kolorystyka/ Colours:		Opracował/ Prepared by:	08.12.2022 W.Streng

ОЛІДЕТРИМ



Олідетрим КІДС
дієтична добавка
15 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
Краплі у флаконі
10 мл (ml),
що містить 61 дозу
продукту.



Олідетрим
дієтична добавка
25 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
м'які желатинові капсули
типу twist-off по 30 капсул
у упаковці.



Олідетрим 2000
дієтична добавка
50 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
м'які желатинові
капсули по 30 або 60 або
90 капсул у упаковці.



Олідетрим 4000
дієтична добавка
100 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
м'які желатинові
капсули по 30 або 60 або
90 капсул у упаковці.

ОЛІДЕТРИМ

краплі в м'яких капсулах для дітей від 4 місяців

Склад: 1 капсула містить: основні речовини: олія МСТ (жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга) – 420 мг (mg), вітамін D₃ (холекальциферол) – 25 мкг (µg) (1000 IU); допоміжні речовини: оболонка капсули: желатин, гліцерин.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г (г)/1 капсулу: білки – 0 г (г)/0 г (г), вуглеводи – 0 г (г)/0 г (г), жири – 99,8 г (г)/0,38 г (г), вітамін D₃ – 6,58 мг (mg)/25 мкг (µg); 3693 кДж (kJ)/898 ккал (kcal)/14 кДж (kJ)/3,4 ккал (kcal).

Для поповнення дефіциту вітаміну D у дітей від 4 місяців. Вітамін D₃ виконує велику кількість фізіологічних функцій. Найважливішою функцією вітаміну D₃ є регулювання метаболізму кальцію та фосфору, що сприяє нормальному формуванню і росту кісток.

Вітамін D₃ необхідний для нормального розвитку дитячого організму – впливає на всмоктування кальцію і сприяє підтримці його відповідного рівня в крові. При недостатньому рівні вітаміну D₃ в організмі засвоюється лише 10-15 % кальцію, який поступає із продуктами харчування. Окрім впливу на мінеральний обмін, вітамін D₃ впливає на обмін речовин (синтез ліпідів, білків, ферментів, гормонів), регулює функції органів та систем (серцево-судинної системи, печінки, нирок, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту). Вітамін D₃ приймає, також, участь у функціонуванні імунної системи, недостатність його призводить до збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Частина необхідної дози Вітаміну D₃ природним способом утворюється у шкірі під впливом сонячного світла і у невеликих кількостях надходить в організм з харчуванням. Проте, такого поповнення недостатньо, зважаючи на обмежений вплив сонячного світла (синтез відбувається лише в ясні літні дні з червня по серпень) та невелику кількість вітаміну D₃ в продуктах харчування. Недостатність вітаміну D₃ в період швидкого росту дитини призводить до рахіту, у дорослих – до остеомаляції, у вагітних жінок – до появи симптомів тетанії і неутворення зубної емалі у немовлят.

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D₃ з метою профілактики рахіту у дітей грудного (діти віком від чотирьох місяців до одного року) та раннього віку (діти віком від одного до трьох років), а також для профілактики та корекції вітамін-D-дефіцитних станів у дорослих. Регулює всмоктування та засвоєння кальцію та фосфору в організмі дітей та дорослих.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:

Для дітей: перед застосуванням слід відкрити капсулу. Для відкриття капсули необхідно прокрутити і відірвати верхню її частину (головку). Застосовувати дієтичну добавку, в залежності від віку дитини та способу яким вона може вжити добавку:

- видавити вміст капсули безпосередньо в ротovu порожнину дитини, перед годуванням;
- видавити вміст капсули у чайну ложку питної води, молока чи дитячого харчування;
- нанести вміст капсули на пуштуху та дати її дитині на 20-30 хвилин;
- нанести вміст капсули на сосок грудної залози матері-годувальниці перед годуванням дитини.

Будьте обережні, при видавлюванні вмісту капсули, щоб не упустити капсулу в ротovu порожнину (аби уникнути можливості вдавитися капсулою) і обережно здавлюйте капсулу, щоб не призвести до розбрикування її вмісту. Вживати одразу після відкриття.



Донашеми здоровим дітям грудного віку (діти від чотирьох місяців до одного року) та дітям раннього віку (діти віком від одного року до трьох років), дітям від трьох до шести років давати щоденно по 1 капсулі на добу (за виключенням трьох літніх місяців). В інших випадках дозу призначає лікар.

Увага! Для розведення вмісту капсули використовувати воду гарантованої безпеки та якості. Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел.

Для дорослих: капсулу можливо ковтати запиваючи невеликою кількістю питної води або вживати вміст капсули, попередньо її відкривши. Для відкриття капсули необхідно прокрутити і відірвати верхню її частину (головку). Вживати по 1 капсулі на добу, якщо лікар не призначив інакше.

Особливості щодо застосування: перед застосуванням та при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів обов'язкова консультація лікаря. Дітям грудного віку, котрі вигодовуються із застосуванням адаптованих сумішей, що містять вітаміни групи D, у кількостях добової фізіологічної потреби, давати додаткову дієтичну добавку «ОЛІДЕТРИМ» не потрібно. При змішаному вигодовуванні, лікар призначає індивідуальну добову дозу дієтичної добавки «ОЛІДЕТРИМ», виходячи з розрахунку вмісту вітаміну D у адаптованих сумішах та грудному молоці, а також продуктах харчування. Не застосовувати одночасно з препаратами, що містять вітаміни групи D. Перед застосуванням та в процесі застосування необхідно контролювати вміст кальцію в сечі.

UVID-2173-800

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Дієтична добавка «ОЛІДЕТРИМ» не призначена для парентерального застосування. Не використовувати дієтичну добавку «ОЛІДЕТРИМ» після закінчення терміну придатності.

Протипоказання: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Форма випуску: м'які желатинові капсули типу twist-off № 30 (15 × 2): по 15 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.

Маса нетто 1 упаковки: 18 г (г) – 30 капсул.

Маса 1 капсули: 0,60 г (г) ± 10 %.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °C до 25 °C.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:

юридична адреса: Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., Відділення «Медана» в м. Серадз, вул. В. Локетка 10, 98-200 Серадз, Польща; тел.: +48 43 829 92 00; *адреса потужностей виробництва:* вул. Польської Організації Військової 57, 98-200 Серадз, Польща.

Підприємство виробника в Україні, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів та несе відповідальність за якість та безпечність продукту: ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, E-mail: uaoffice@polpharma.com.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера:

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87; ТОВ «БадМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10; ТОВ «Вента.ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00; СП «Оптіма-Фарм», ЛТД, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10. ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03