KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX

110 mm x 390 mm

linia złożenia/
folding line

Materiał/ Material:	**ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:**		
Wzór/ Artwork:	**UTIG-2191-000_1**		
Preparat/ Product:	**SIMETIGAST 40 mg**		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 130 x 400 mm Złożenie wykonuje drukarnia. Złożenie musi być zaprasowane/ Folding is made by printing house. Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Trebuchet MS 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m^2	Farmakod/ Pharmacode:	234
Kolorystyka/ Colours:	**Pantone 2767U**	Opracował/ Prepared by:	17.01.2018 W.Jeziorska

Instrukcja używania wyrobu medycznego

polpharma

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Simetigast

40 mg symetykonu w kapsułce miękkiej
Wyrób medyczny

Spis treści:

1. Co to jest wyrób medyczny Simetigast i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Simetigast
3. Jak stosować wyrób medyczny Simetigast
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać wyrób medyczny Simetigast
6. Inne informacje

Skład
Symetykon, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona.

1. Co to jest wyrób medyczny Simetigast i w jakim celu się go stosuje

Wyrób medyczny Simetigast przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w obrębie jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.
Wyrób medyczny Simetigast 40 mg wspomaga również usuwanie piany, gazów i powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej – ultrasonografią, endoskopią i radiografią, dzięki czemu ulega poprawie jakość uzyskiwanych obrazów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Simetigast

Nie należy stosować wyrobu medycznego Simetigast:
- w przypadku wcześniej stwierdzonej nadwrażliwości na symetykon lub jakikolwiek inny składnik wyrobu;
- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie są znane interakcje (oddziaływania) symetykonu w grupie wiekowej powyżej 12 lat. Ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnych interakcji nie zaleca się stosowania wyrobu jednocześnie z innymi lekami.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

3. Jak stosować wyrób medyczny Simetigast

Wyrób medyczny Simetigast 40 mg należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji używania wyrobu medycznego. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Wyrób medyczny bez konsultacji z lekarzem można stosować do 4 tygodni.
Jeśli dolegliwości żołądkowo-jelitowe nie ustępują, nawracają lub nasilają się, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3-4 razy dziennie po 2 kapsułki.

Wyrób medyczny Simetigast należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości popijając wystarczającą ilością płynu.

Przed badaniami diagnostycznymi:
2 kapsułki 3 razy dziennie w dniu poprzedzającym badanie (240 mg symetykonu) i 2 kapsułki rano w dniu badania (80 mg symetykonu).

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Brak doniesień o znaczących działaniach niepożądanych po zastosowaniu symetykonu.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę.

5. Jak przechowywać wyrób medyczny Simetigast

Przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować wyrobu medycznego Simetigast po upływie terminu ważności ( ) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Puste opakowanie wyrobu powinno być zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Dotyczy to również niewykorzystanego przeterminowanego wyrobu.

6. Inne informacje

Opakowanie zawiera 25 lub 100 kapsułek miękkich wraz z instrukcją używania.

CE 1434

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych z wyrobem medycznym lub w celu uzyskania informacji o produkcie należy zwrócić się do przedstawiciela wytwórcy:
Polpharma Biuro Handlowe
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 00

Data opracowania instrukcji: 01.2018 r.

Znaczenie zastosowanych symboli:

Nie używać w przypadku widocznego uszkodzenia opakowania

Należy zapoznać się z instrukcją używania

Użyć do: (termin ważności)

Producent

LOT Numer serii

+25°C Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C