

Informacja dla lekarza

Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Mibrex i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia lekiem Mibrex.

Co należy wiedzieć o leku Mibrex?

- Lek Mibrex rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Mibrex należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, **nigdy nie należy pomijać dawki.**
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Mibrex bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mibrex należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Mibrex przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Mibrex, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym.

Nie rozpoczynać przyjmowania leku Mibrex bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka

wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi okres czasu,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z dróg rodnych o większym nasileniu niż zwykle,
- krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,

- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

Jak przyjmować lek Mibrex?

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Mibrex

- 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
- 15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem
- 20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem.

KARTA PACJENTA

Mibrex®

10 mg 15 mg 20 mg
(należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

**KARTEę NALEŻY
ZAWSZE PRZECHOWYWAĆ
PRZY SOBIE**

**Kartę należy pokazywać przed
leczeniem każdemu
lekarzowi lub dentyście**

**Jestem poddawany(-a) leczeniu
przeciwzakrzepowemu
lekiem Mibrex (rywaroksaban).**

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Data urodzenia: _____

Masa ciała: _____

Inne leki i choroby: _____

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Imię i nazwisko lekarza: _____

Telefon lekarza: _____

Pieczętka lekarza: _____

Należy również powiadomić:

Imię i nazwisko: _____

Telefon: _____

Pokrewieństwo: _____