

EMSKIE NA GARDŁO®



Pastyłki do ssania z solą emską

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

1. OPIS I DZIAŁANIE PRODUKTU

EMSKIE NA GARDŁO® pastylki do ssania z solą emską zawierają substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów i anionów występujących w postaci mieszaniny soli nieorganicznych. Pastyłki w tej postaci posiadają wydłużony kontakt soli o lekkim alkalicznym odczynie z błoną śluzową jamy ustnej, gardła i krtani przez co alkalizują i rozrzedzają wydzielinę. Miejscowa podwyższona koncentracja kationów i anionów powoduje zjawisko transportu wody z komórek błon śluzowych na zasadzie zjawiska osmozy. Mechanizmy te pobudzają wydzielanie śluzu i ułatwiają odkrztuszanie co łagodzi kaszel i chrypkę.

EMSKIE NA GARDŁO® przywracają równowagę pH w jamie ustnej. Podstawowym przeznaczeniem tych pastylek jest łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwianie odkrztuszania. Wyrób medyczny może być używany przez osoby pracujące głosem, palące, a także przebywające w zadymionych lub ogrzewanych pomieszczeniach.

2. KTO MOŻE STOSOWAĆ EMSKIE NA GARDŁO®

Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia.

3. JAK STOSOWAĆ EMSKIE NA GARDŁO®

Doustnie: ssać powoli 1 pastylkę 3-5 razy na dobę.

Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

4. PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej soli kuchennej i ograniczyć ilość spożywanej soli. Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej. Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem opłucnej oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników (patrz punkt 6).

5. DZIAŁANIA UBOCZNE

Wyrób może powodować podrażnienia błony śluzowej żołądka, zgagę, wzdęcia, bóle brzucha. Długotrwałe stosowanie soli Emskiej może powodować tworzenie się kamieni nerkowych i podatność na zakażenia układu moczowego. Wyrobu medycznego „Emskie na gardło” nie należy stosować w przebiegu gruźlicy, krztuśca, zapalenia opłucnej oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Stosowanie u kobiet w ciąży i karmiących

Zawartość sodu w soli emskiej może np. pogłębić obrzęki nóg w przebiegu ciąży, dlatego przed zastosowaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Jednoczesne stosowanie innych leków

Sól emska zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego, więc może nasilić drażniące działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. większość dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych). Ponadto może wpłynąć na siłę działania leków o charakterze słabych kwasów (osłabienie) i zasad (zwiększenie siły działania). O wszystkich przyjmowanych jednocześnie lekach należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Możliwe działania niepożądane

Rzadko (czyli mniej niż 1 na 1000 przypadków) może pojawić się podrażnienie błony śluzowej żołądka, zgaga, wzdęcie, ból brzucha.

6. SKŁAD

Wykaz składników w 1 tabletkce:

KATIONY		ANIONY		POZOSTAŁE SKŁADNIKI
K ⁺	1,57	HCO ₃ ⁻	140,79	izomalt, sukraloza, stearynian magnezu, aromat
Na ⁺	73,59	Cl ⁻	30,34	
		SO ₄ ²⁻	3,62	
		HPO ₄ ²⁻	0,08	

7. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze do 25°C oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

8. OPAKOWANIE

W opakowaniu znajduje się 30 pastylek do ssania. Nie stosować po upływie terminu ważności.

EMSKIE NA GARDŁO® pastylki do ssania z solą emską są wyrobem medycznym dostępnym bez recepty.

Postępowanie ze zużytym produktem: zużyty produkt należy traktować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów medycznych.



9. OSTRZEŻENIA

Wyrób może być stosowany przez okres do 6 miesięcy od dnia pierwszego użycia.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.



Wytwórca:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
„Ziolołek” Sp. z o.o.
ul. Staroleśka 189, 61-341 Poznań
www.ziololek.pl

Data ostatniej zmiany instrukcji: 22/11/2021

	Wytwórca		Wyrób medyczny
	Data ważności		Zajrzyj do Instrukcji używania
	Numer serii		Temperatura przechowywania
	Wyrób może być stosowany przez okres 6 miesięcy od dnia pierwszego użycia		Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Chronić przed wilgocią		Chronić przed światłem słonecznym