



Przed rozpoczęciem
terapii lekiem FENOXA
Karta przypominająca
dla pacjentek dotycząca ciąży:

FENOXA (fingolimod)

 **FENOXA**
Fingolimod

Podczas przyjmowania leku FENOXA



Lek FENOXA (fingolimod) jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym (w tym nastoletnich dziewcząt) niestosujących skutecznej antykoncepcji.



Podczas rozpoczynania leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu lekarz prowadzący będzie informował Panią o ryzyku teratogennym i niezbędnych działaniach minimalizujących to ryzyko.



Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy i uzyskać wynik negatywny, który powinien być zweryfikowany przez lekarza.

Lekarz poinformuje Panią o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 2 miesiące po jego zakończeniu.

Należy porozmawiać z lekarzem o najbardziej skutecznych formach antykoncepcji dostępnych dla Pani.



Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania z lekiem FENOXA przekazanej przez lekarza.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem FENOXA



Podczas leczenia pacjentki nie mogą zajść w ciążę.

Pacjentki muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania leku FENOXA.



Pacjentki nie mogą zajść w ciążę podczas leczenia i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia.

Testy ciążowe należy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu.

Lekarz prowadzący będzie regularnie informował pacjentkę o poważnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku FENOXA dla płodu.

Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub jeśli chce Pani zajść w ciążę, należy omówić to z lekarzem, ponieważ leczenie lekiem FENOXA musi zostać przerwane.

Podczas przyjmowania leku FENOXA



W przypadku ciąży lekarz udzieli Pani informacji.



Lekarz udzieli Pani porady medycznej dotyczącej szkodliwego wpływu leku FENOXA na płód i przekaze ocenę potencjalnych skutków leczenia.

Należy wykonać badanie ultrasonograficzne i zakończyć leczenie lekiem FENOXA.

Po zakończeniu terapii lekiem FENOXA



Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli uważa Pani, że występujące u Pani SM nasila się (np. występuje osłabienie lub zaburzenia widzenia) lub jeśli zauważy Pani jakiegokolwiek nowe objawy po zakończeniu leczenia lekiem FENOXA z powodu ciąży.



Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia lekiem FENOXA z uwagi na czas, jaki jest potrzebny, by lek FENOXA został usunięty z organizmu.



 **FENOXA**
Fingolimod



 *polpharma*