

KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION



POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
120 mm x 490 mm

250 mm

linia złożenia/
folding line

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/Artwork:	UTIG-2202-000_1		
Preparat/ Product:	Simetigast Forte 240 mg		
Rozmiar ulotki/ Leaflet size	140 x 500 mm		
Adnotacje/ Annotations:	Złożenie wykonuje drukarnia. Złożenie musi być zaprasowane/ Folding is made by printing house. Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	216
Kolorystyka/ Colours:	■ P. 2767 U	Opracował/ Prepared by:	26.06.2026 M.Turzyński



Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Simetigast Forte

240 mg symetykonu w kapsułce miękkiej
Wyrób medyczny

Spis treści:

1. Co to jest wyrób medyczny Simetigast Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Simetigast Forte
3. Jak stosować wyrób medyczny Simetigast Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać wyrób medyczny Simetigast Forte
6. Inne informacje

Skład

Symetykon, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona.

1. Co to jest wyrób medyczny Simetigast Forte i w jakim celu się go stosuje

Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w obrębie jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.
Wyrób medyczny Simetigast Forte wspomaga również usuwanie piany, gazów i powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej – ultrasonografią, endoskopią i radiografią, dzięki czemu ulega poprawie jakość uzyskiwanych obrazów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Simetigast Forte

Nie należy stosować wyrobu medycznego Simetigast Forte:

- w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na symetykon lub jakiegokolwiek inny składnik wyrobu;
- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego;
- u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie są znane interakcje (oddziaływania) symetykonu w grupie wiekowej powyżej 12 lat. Ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnych interakcji nie zaleca się stosowania wyrobu jednocześnie z innymi lekami.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Stosowanie wyrobu medycznego Simetigast Forte nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami ani na obsługę maszyn.

3. Jak stosować wyrób medyczny Simetigast Forte

Wyrób medyczny Simetigast Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia wyrobu medycznego. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bez konsultacji z lekarzem wyrób medyczny można stosować do 4 tygodni. W razie konieczności i po konsultacji z lekarzem wyrób medyczny można stosować przez dłuższy czas.

Dawkowanie:

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2-3 razy dziennie po 1 kapsułce.

Wyrób medyczny Simetigast Forte należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości popijając wystarczającą ilością płynu.

Przed badaniami diagnostycznymi:

1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie (240 mg symetykonu) i 1 kapsułka rano w dniu badania (240 mg symetykonu).

W przypadku pominięcia dawki wyrobu medycznego Simetigast Forte nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli dolegliwości żołądkowo-jelitowe nie ustępują, nawracają lub nasilają się, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Brak doniesień o znaczących działaniach niepożądanych po zastosowaniu symetykonu. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę.

5. Jak przechowywać wyrób medyczny Simetigast Forte

Przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować wyrobu medycznego Simetigast Forte po upływie terminu ważności (📅), zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Puste opakowanie wyrobu powinno być zutyliczowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Dotyczy to również niewykorzystanego przeterminowanego wyrobu.

6. Inne informacje

Opakowanie zawiera 2, 10, 20, 40 lub 60 kapsułek miękkich wraz z instrukcją używania.



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych z wyrobem medycznym należy zwrócić się do Producenta:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
tel. 22 364 61 00

Data aktualizacji instrukcji: 04.2021

Znaczenie zastosowanych symboli:



Nie używać w przypadku widocznego uszkodzenia opakowania.



Należy zapoznać się z instrukcją używania



Użyć do: (termin ważności)



Wytwórca



Numer serii



Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

